

25.04.2018

Стронгхолд 6%
(розчин для зовнішнього застосування)
листівка-вкладка

Опис

Розчин для зовнішнього застосування у пластикових тубах.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:
селамектин - 60 мг.

Допоміжні речовини: діпропіленгліколь метил ефір, ізопропіловий спирт, бутилгідрокситолуен.

Фармакологічні властивості

ATCvetQP54, ендектоциди(QP54AA05, селамектин)

Діюча речовина препарату селамектин – напівсинтетичний івermектин. Механізм дії пов’язаний зі зміною активності хлорних каналів синаптичних мембран у нервовій та м’язовій системах багатьох ектопаразитів. Зв’язуючись зі специфічними рецепторами, він збільшує проникність синаптичних мембран для іонів хлору, що призводить до блокади активності нервових та м’язових клітин паразитів, та, як наслідок, їх паралічу та загибелі. У ссавців подібні рецептори розміщені лише у центральній нервовій системі. Оскільки селамектин не володіє здатністю проникати крізь гематоенцефалічний бар’єр, він має високий рівень безпечності, і у рекомендованих дозах є безпечним для собак та котів.

Селамектин проявляє широкий спектр системної нематодоцидної, інсектицидної та акарицидної дії, має ларвоцидні та овоцидні властивості.

Діюча речовина із препарату швидко і повністю всмоктується з місця нанесення у кров. Терапевтична концентрація селамектину у крові підтримується тривалий час, забезпечуючи знищенння паразитів та захист від реінвазії впродовж місяця.

Застосування

Собаки: профілактика та лікування отодектозу (*Otodectes cynotis*), саркоптозу (*Sarcoptes canis*), токсокарозу (*Toxocara canis*), інвазії волосоїдів (*Trichodectes canis*) та бліх (*Ctenocephalides spp.*, *Pulex irritans*), а також для профілактики дирофіляріозу (*Dirofilaria immitis* та *Dirofilaria repens*).

Коти: профілактика та лікування отодектозу (*Otodectes cynotis*), анкілостомозу (*Ancylostoma tubaeforme*), токсокарозу (*Toxocara cati*), інвазії волосоїдів (*Felicola subrostratus*) та бліх (*Ctenocephalides spp.*), а також для профілактики дирофіляріозу (*Dirofilaria immitis* та *Dirofilaria repens*).

Дозування:

Препарат наносять на суху шкіру між лопаткам у наступних дозах:

Коти маса тіла, кг	Колір ковпачка	Дозад.р. на тварину, мг	Концентрація	Номінальний об’єм туби, мл
≤2,5	Рожевий	15	6%	0,25
2,6 – 7,5	Блакитний	45	6%	0,75
7,6 – 10,0	Темно-синій	60	6%	1,00
>10,0	Потрібна комбінація туб з розрахунку 6 мг на кг маси тіла			

Собаки маса тіла, кг	Колір ковпачка	Доза д.р. на тварину, мг	Концентрація	Номінальний об’єм туби, мл
≤2,5	Рожевий	15	6%	0,25
> 2,5	Потрібно використання препарату в концентрації 12%			

Знищення бліх (собаки та коти)

Після нанесення препарату дорослі блохи гинуть. Для запобігання інвазії або реінвазії препарат застосовують один раз на місяць впродовж сезону активності бліх. Лікування вагітних та лактуючих тварин запобігає блошиній інвазії у кошенят та цуценят до 7-тижневого віку.

Для використання як складової частини терапії при блошиному алергічному дерматиті препарат застосовують з місячним інтервалом.

Профілактика дирофіляріозу (собаки та коти)

Для профілактики дирофіляріозу «Стронгхолд 6 %» застосовують тваринам кожного місяця, починаючи за місяць до початку льоту переносників збудника – москітів/комарів та закінчують не раніше ніж через місяць після завершення льоту комах. У випадку, коли місячний інтервал між двома використаннями «Стронгхолду 6 %» був порушений, препарат наносять одразу, як тільки з'являється така можливість, що мінімізує можливість розвитку статевозрілих дирофілярій. У випадку використання іншого препарату для профілактики дирофіляріозу, наступне використання препарату «Стронгхолд 6 %» проводять через місяць після останнього використання попереднього препарату.

Дегельмінтизація при токсокарозі (собаки та коти)

Тварини віком від 6 тижнів та старше: препарат застосовують однократно.

Лікування від волосоїдів (собаки та коти)

Препарат застосовують однократно.

Лікування отодектозу (собаки та коти)

Препарат застосовують однократно. Перед лікуванням рекомендують прочистити слуховий прохід від ексудату та струпів. У разі необхідності курс лікування повторюють через місяць.

Лікування анкілостомозу (коти)

Препарат застосовують однократно.

Лікування саркоптозу (собаки)

Препарат застосовують двічі з інтервалом один місяць.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам віком до 6 тижнів, а також виснаженим і хворим тваринам.

Застереження

Препарат застосовують лише для зовнішнього застосування.

Не наносити препарат на вологу шкіру.

Не можна купати тварин впродовж 2 годин після нанесення препарату (до повного висихання).

Не слід палити, пити або їсти під час роботи з препаратом.

Препарат зберігати подалі від джерел тепла та вогню.

Після обробки тварин необхідно ретельно вимити руки з мілом. При випадковому попаданні препарату в очі промити їх проточною водою та звернутися до лікаря.

Не допускати злизування твариною препарату після обробки. У разі злизування значної кількості препарату у котів можлива гіперсалівація, яка самостійно проходить через короткий період часу.

Препарат токсичний для риб та водних організмів.

Форма випуску

Препарат випускається в однодозованих пластикових тубах в алюмінієвих блістер-пакетах по 0,25; 0,75 та 1,00 мл з ковпачками, відповідно, рожевого, блакитного та темно-синього кольору:

туби з рожевим ковпачком - 0,25 мл 6% розчину;

туби з блакитним ковпачком - 0,75 мл 6% розчину;

туби з темно-синім ковпачком – 1,00 мл 6% розчину.

Вторинне пакування – картонні коробки, що містять три блістер-пакети з тубами.

Зберігання

Сухе темне місце за температури від 10 до 30 ° С. Не заморожувати!

Продовження додатку 2
до реєстраційного посвідчення АА-03667-01-13
25.04.2018

Термін придатності – 3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

Зоетіс Інк., 10 Сільван Вей,
Парсіппані, Нью Джерсі,
07054, США

Zoetis Inc., 10 Sylvan Way,
Parsippany, New Jersey,
07054, USA

Виробник готового продукту

Зоетіс Інк,
2605 I Кілгор Роуд, Каламазу,
MI 49001, США

Zoetis Inc,
2605 E Kilgore Road, Kalamazoo,
MI 49001, USA