

21.12.2022

АНТИ ІНТИМ
(розчин для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Маслянистий розчин від жовтуватого до жовтого кольору зі специфічним запахом складників, допускається незначний осад.

Склад:

1 мл препарату містить діючу речовину:

медроксипрогестерону ацетат - 20 мг.

Допоміжні речовини: спирт бензиловий, ароматизатор, олія бавовняна.

Фармакологічні властивості

ATCvet QG, ветеринарні препарати, що впливають на сечостатеву систему і статеві гормони (QG03A гормональні контрацептиви для системного застосування).

Діючою речовиною препарату є медроксипрогестерону ацетат - синтетичний прогестин, аналог прогестинів, що продукуються жовтим тілом. Дія полягає в перетворенні проліферативного ендометрія на секреторний, посилює гіпертрофію міометрія і пригнічує скорочення матки. Залежно від дози пригнічує секрецію гіпофізарних гонадотропінів, має антиінсулінову дію.

У тварин медроксипрогестерону ацетат має виражений адренкортикальний ефект і пригнічує виділення адренкортикотропного гормону та кортизолу.

Медроксипрогестерон має антиестрогенну дію і знижує рівень тестостерона в плазмі крові самців.

Застосування

Препарат застосовують перорально самкам і самцям собак та котів.

Сукам та кішкам для затримки і переривання тічки; котам і кобелям - для зниження статевої активності і корекції небажаної поведінки (мічення території сечею, внутривидової агресії, підвищеної збудливості).

Препарат також запобігає виникненню ознак псевдовагітності і лактації.

Дозування

Застосовують перорально, примусово на корінь язика або з невеликою кількістю корму за 1-2 години до основного годування тварини. Перед використанням флакон з розчином ретельно збовтати.

Кішки - для попередження тічки – 0,25 мл (7 крапель з флакону-крапельниці) препарату 1 раз на тиждень. Застосовувати препарат впродовж періоду, коли бажано відтермінувати тічку. Після припинення застосування препарату охота настає приблизно через 2 тижні. Препарат не можна застосовувати довше ніж 18 місяців.

Для припинення тічки – 0,25 мл (7 крапель з флакону-крапельниці) препарату 1 раз на добу впродовж 3-5 діб до припинення ознак тічки, не пізніше чим на другий день після початку тічки, а потім 0,25 мл (7 крапель з флакону-крапельниці) препарату 1 раз на тиждень. Переривати тічку не можна частіше чим 2 рази на рік.

Коти - при появі ознак статевого збудження, для заспокоєння і корекції небажаної поведінки (мічення території сечею, внутривидової агресії, підвищеної збудливості) – 0,25 мл (7 крапель з флакону-крапельниці) препарату 1 раз на добу впродовж 8 діб і далі по 0,25 мл (7 крапель) препарату - 1 раз на тиждень.

Сукам:

- для попередження тічки – 0,25 мл (7 крапель з флакону-крапельниці) препарату на 10 кг маси тіла тварини 1 раз на добу за 7-15 діб до початку тічки, після припинення застосування препарату охота настає через декілька днів; препарат не можна застосовувати довше чим 32 доби безперервно;

- для припинення тічки – 0,25 мл (7 крапель з флакону-крапельниці) препарату на 10 кг маси тіла тварини 1 раз на добу впродовж перших 3 діб, а потім ½ попередньої дози на 10 кг маси тіла тварини 1 раз на добу протягом 7 діб до припинення ознак тічки, не пізніше чим на третій день після початку тічки. Після припинення застосування препарату тічка, зазвичай, починається через 4-9 місяців. Не рекомендується застосовувати препарат частіше, ніж 2 курси на рік.

21.12.2022

Кобелі - при появі ознак статевого збудження, для заспокоєння і корекції небажаної поведінки (мічення території сечею, внутривидової агресії, підвищеної збудливості) - 1 мл або 30 крапель з флакону-крапельниці препарату на 10 кг маси тіла тварини на добу впродовж 8 діб, а потім 0,5 мл або 15 крапель з флакону-крапельниці мл препарату на 10 кг маси тіла тварини на добу впродовж 8 діб.

Протипоказання

Препарат не застосовують тваринам в період вагітності і лактації і при псевдовагітності і лактації!

Препарат не застосовують при захворюваннях сечостатевої та ендокринної систем, порушенні регулярності статевого циклу, пухлинах молочної залози, у статевонезрілих тварин (до першої тічки)!

Препарат не застосовують, якщо після виникнення тічки пройшли більш ніж 2 доби!

Застереження

При тривалому застосуванні можливі зміни статевого циклу, збільшення молочних залоз, надмірний апетит і збільшення маси тіла.

Препарат застосовувати під наглядом ветеринарного лікаря, особливо для собак породи хорт (борза).

Форма випуску

Флакони полімерні з крапельницею по 2,5, 5,0 мл. Флакони полімерні по 10 мл. Вторинна упаковка – картонна коробка.

У вторинній упаковці з флаконом по 10 мл міститься шприц.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 до 25°C.

Термін придатності

2 роки з дати виробництва.

Власник реєстраційного посвідчення

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"
61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна

Виробник готового продукту:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"
61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна