



РЕЕСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину», постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1349 «Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів» та на підставі експертного висновку 27.03.2019 № 971-К/06, рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, наказу Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів 10.04.2019 № 302 зареєстровано:

продукт Адвантейдж®

форма Краплі для зовнішнього застосування, точкового нанесення

Власник реєстраційного посвідчення:

Байер Енімал Хелс ГмбХ

D-51368, Леверкузен, НІМЕЧЧИНА

зареєстровано в Україні за № AA-05099-03-14 від 10.04.2019

Виробник:

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ

Проєнсдорфер стр. 324, D-24106 Кіль, НІМЕЧЧИНА

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка препарату (додаток 2);
- етикетка (додаток 3).

Реєстраційне посвідчення дійсне до: 09.04.2024

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного продукту.



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

Державний науково-дослідний контрольний інститут
ветеринарних препаратів та кормових добавок

**Національне агентство ветеринарних
препаратів та кормових добавок**

Р/р 26006000027909 у АТ «Укресімбанк»
МФО 322313, ЄДРПОУ 00485670
вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019, Україна
тел.: (032) 252-82-84; факс: (032) 252-11-93
e-mail: agency@scvip.lviv.ua www.scvip.lviv.ua



STATE SERVICE FOR FOOD SAFETY AND
CONSUMER PROTECTION OF UKRAINE

State scientific-research control institute of veterinary
medicinal products and feed additives

**National agency of veterinary medicinal
products and feed additives**

Acc. 26006000027909 «The State Export
Import Bank of Ukraine» Public Joint Stock Company.
Sort Code 322313 EDRPOU 00485670
Donetska str., 11, Lviv, 79019, Ukraine
tel.: 380 32 252-82-84; fax: +380 32 252-11-93
e-mail: agency@scvip.lviv.ua www.scvip.lviv.ua

27.03.2019 № 971-К/06

**Директору Департаменту безпеки
харчових продуктів та ветеринарної
медицини Держпродспоживслужби
Кобалю Б.І.**

**ТОВ «БАЙЄР», УКРАЇНА
за дорученням
Байєр Енімал Хелс ГмбХ, НІМЕЧЧИНА.**

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

за результатами наукової експертизи реєстраційного досьє та аналітичних випробувань препарату
Адвантейдж®
власник Байєр Енімал Хелс ГмбХ, (НІМЕЧЧИНА)
виробник КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ, (НІМЕЧЧИНА)
згідно з контрактом № 538 від 29.11.2018 р.

За результатами проведеної наукової експертизи реєстраційного досьє та випробувань
препарату Адвантейдж®, краплі для зовнішнього застосування, точкового нанесення, власник
Байєр Енімал Хелс ГмбХ, (НІМЕЧЧИНА), виробник КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ,
(НІМЕЧЧИНА) рекомендовано його перереєстрацію в Україні.

Реєстраційне посвідчення: АА-05099-03-14

**Директор Інституту,
д.в.н., професор,
академік НААН**

Голова Агентства, д.б.н.

І.Я. Коцюмбас

Ю.М. Косенко

1 0. 0 4. 2019

Коротка характеристика препарату

1. Назва

Адвантейдж®

2. Склад

100 мл препарату містять діючу речовину:

імідаклоприд – 10,0 г.

Допоміжні речовини: спирт бензиловий, пропілену карбонат, антиоксидант бутилгідрокситолуен.

3. Фармацевтична форма

Краплі для зовнішнього застосування, точкового нанесення.

4. Фармакологічні властивості

АТС vet: QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AX17, імідаклоприд)

Діюча речовина препарату *Імідаклоприд*, 1-(6-*Chloro-3-pyridylmethyl*)-*N-nitro-imidazolidin-2-ylideneamine* – ектопаразитицид, що належить до групи хлорнікотинілових сполук. Має високу спорідненість до нікотинергічних ацетилхолінових рецепторів у постсинаптичних ділянках центральної нервової системи бліх. Він приєднується до нікотинергічного рецептора блохи, розміщеного на постсинаптичному нейроні, перериває передачу нервового імпульсу, що в подальшому призводить до загибелі паразита.

Слабка взаємодія імідаклоприду з нікотиновими рецепторами ссавців зумовлює низький рівень проникнення через гематоенцефалічний бар'єр, тому імідаклоприд практично не впливає на ЦНС тварин. Імідаклоприд ефективний проти личинок бліх та зрілих особин.

Після місцевого застосування препарату імідаклоприд швидко розповсюджуються по всій шкірі тварини впродовж однієї доби після нанесення. Клінічно доведено, що системна абсорбція препарату дуже низька.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Коти, декоративні кролі.

5.2 Показання до застосування

Профілактика та лікування котів і декоративних кролів при ураженні блохами *Ctenocephalides felis*. Препарат може бути застосований для лікування алергічного блошиного дерматиту. Одна обробка захищає котів від повторної інвазії протягом 4-х тижнів, а кролів протягом 1 тижня.

5.3 Протипоказання

Не застосовувати кошенятам віком до 8-ми тижнів.

Не застосовувати декоративним кролям віком до 10-ти тижнів.

Не застосовувати кролям, м'ясо яких призначається для вживання в їжу людям.

Не застосовувати тваринам з відомою гіперчутливістю до складових препарату.

5.4 Побічна дія

Препарат гіркий на смак і може викликати саливацію у тварин при злизуванні препарату після нанесення на шкіру, але це не є ознакою інтоксикації. Ознаки гіперсаливації зникають через декілька хвилин.

У дуже рідких випадках після нанесення препарату можуть виникнути такі шкірні реакції як втрата шерсті, почервоніння, свербіж та ураження шкіри. Може виникнути слинотеча та інші розлади нервової системи, такі як порушення координації, тремор і депресії, які були зареєстровані виключно у котів.

5.5 Особливі застереження при використанні

Обробку тварин препаратом треба проводити таким чином, щоб препарат не попадав тварині в очі та ротову порожнину.

Після обробки тварин препаратом не допускати контакту тварин один з одним до повного висихання шкіри.

5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Застережень немає.

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

При дворазовому підвищенні рекомендованої дози препарату та одночасному застосуванні таких ветеринарних препаратів, як луфенорон, пірантел, празіквантел несумісності не спостерігалось. Також доведена сумісність препарату при одночасному використанні багатьох ветеринарних препаратів, у тому числі і вакцин.

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку


Для тварин масою тіла до 4 кг застосовують 1 піпетку Адвантейдж*40 (0,4 мл), більше 4 кг - Адвантейдж*80 (0,8 мл).

Повторна інвазія блохами із зовнішнього середовища можлива через 6 тижнів і більше після обробки. Додатково рекомендується обробляти місця перебування тварин (підстилки, коврики) для знищення дорослих та личинкових стадій бліх.


Препарат не втрачає ефективності при намоканні шерсті тварини, але у таких випадках можлива додаткова обробка – залежно від наявності бліх у навколишньому середовищі. У таких випадках не рекомендується обробляти тварину частіше, ніж 1 раз на тиждень.

Спосіб застосування:

Вийміть піпетку з упаковки, тримайте у вертикальному положенні. Зніміть ковпачок, переверніть його та одягніть на піпетку, таким чином видаливши пломбу.



Розділіть шерсть на шиї тварини біля основи черепа так, щоб було видно шкіру. Розмістіть вузький кінець піпетки на шкіру, міцно стисніть піпетку декілька разів, щоб нанести весь вміст безпосередньо на шкіру.



Використовувати тільки на непошкоджену шкіру. Не допускати щойно оброблених тварин вилізувати одне одного !

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

При 5-кратному перевищенні рекомендованої дози препарату для котів та 4-кратному перевищенні для кролів впродовж 4-х тижнів поспіль у тварин не спостерігалось клінічних ознак передозування.

5.10 Спеціальні застереження

Немає.

5.11 Період виведення (каренція)

10.04.2019

Для непродуктивних тварин не регламентується.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Під час роботи з препаратом не дозволяється палити, пити і приймати їжу. Після закінчення роботи необхідно вимити руки теплою водою з милом. При випадковому попаданні препарату на шкіру або слизові оболонки його необхідно відразу промити проточною водою. Якщо після попадання препарату на шкіру або в очі подразнення після промивання водою не зникає, необхідно звернутися за медичною допомогою. Не можна гладити тварину і допускати її до маленьких дітей протягом 48 годин після обробки препаратом.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності (основні)

Невідомі.

6.2 Термін придатності

5 років.

6.3 Особливі заходи зберігання

Препарат зберігають у сухому темному, добре вентильованому, приміщенні на стелажах при температурі від 5 до 25 °С.

Зберігати окремо від продуктів харчування та кормів.

6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування

Пропіленові піпетки 0, 4 мл (Адвантейдж*40) та 0,8 мл (Адвантейдж*80).

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний препарат та тара повинні бути знешкоджені у відповідності з національними вимогами.

7. Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення

Байер Енімал Хелс ГмбХ
D-51368, Леверкузен, Німеччина

Bayer Animal Health GmbH (Germany)
D-51368, Leverkusen

8. Назва і місце знаходження виробника

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ
Проенсдорфер стр. 324, D-24106 Кіль,
Німеччина

KVP Pharma+Veterinar Produkte GmbH
(Germany) Projensdorfe Str. 324, D-24106 Kiel

9. Додаткова інформація

Адвантейдж®
(краплі для зовнішнього застосування, точкового нанесення)
листівка-вкладка

Опис

Прозорий розчин від жовтого до світло-коричневого кольору.

Склад

100 мл препарату містять діючу речовину:

імідаклоприд – 10,0 г.

Допоміжні речовини: спирт бензиловий, пропілену карбонат, антиоксидант бутилгідрокситолуен.

Фармакологічні властивості

АТС vet: QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AX17, імідаклоприд)

Діюча речовина препарату **Імідаклоприд**, 1-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitro-imidazolidin-2-ylideneamine – ектопаразитицид, що належить до групи хлорнікотинілових сполук. Має високу спорідненість до нікотинергічних ацетилхолінових рецепторів у постсинаптичних ділянках центральної нервової системи бліх. Він приєднується до нікотинергічного рецептора блохи, розміщеного на постсинаптичному нейроні, перериває передачу нервового імпульсу, що в подальшому призводить до загибелі паразита.

Слабка взаємодія імідаклоприду з нікотиновими рецепторами ссавців зумовлює низький рівень проникнення через гематоенцефалічний бар'єр, тому імідаклоприд практично не впливає на ЦНС тварин. Імідаклоприд ефективний проти личинок бліх та зрілих особин.

Після місцевого застосування препарату імідаклоприд швидко розповсюджуються по всій шкірі тварини впродовж однієї доби після нанесення. Клінічно доведено, що системна абсорбція препарату дуже низька.

Застосування

Профілактика та лікування котів і декоративних кролів при ураженні блохами *Stenoccephalides felis*. Препарат може бути застосований для лікування алергічного блошиного дерматиту. Одна обробка захищає котів від повторної інвазії протягом 4-х тижнів, а кролів протягом 1 тижня.

Дозування


Для тварин масою тіла до 4 кг застосовують 1 піпетку Адвантейдж®40 (0,4 мл), більше 4 кг - Адвантейдж®80 (0,8 мл).

Повторна інвазія блохами із зовнішнього середовища можлива через 6 тижнів і більше після обробки. Додатково рекомендується обробляти місця перебування тварин (підстилки, коврики) для знищення дорослих та личинкових стадій бліх.

Препарат не втрачає ефективності при намоканні шерсті тварини, але у таких випадках можлива додаткова обробка – залежно від наявності бліх у навколишньому середовищі. У таких випадках не рекомендується обробляти тварину частіше, ніж 1 раз на тиждень.


Спосіб застосування:

Вийміть піпетку з упаковки, тримайте у вертикальному положенні. Зніміть ковпачок, переверніть його та одягніть на піпетку, таким чином видаливши фольгу.



1 0 0 4. 2019

Розділіть шерсть на шиї тварини біля основи черепа так, щоб було видно шкіру. Розмістіть вузький кінець піпетки на шкіру, міцно стисніть піпетку декілька разів, щоб нанести весь вміст безпосередньо на шкіру.



Використовувати тільки на непошкоджену шкіру. Не допускати щойно оброблених тварин вилизувати одне одного !

Протипоказання

Не застосовувати кошенятам віком до 8-ми тижнів.

Не застосовувати декоративним кролям віком до 10-ти тижнів.

Не застосовувати кролям, м'ясо яких призначається для вживання в їжу людям.

Не застосовувати тваринам з відомою гіперчутливістю до складових препарату.

Застереження

Під час роботи з препаратом не дозволяється палити, пити і приймати їжу.

Обробку тварин рекомендується проводити у захисних рукавицях.

Після закінчення роботи необхідно вимити руки теплою водою з милом.

При випадковому попаданні препарату на шкіру або слизові оболонки його необхідно відразу промити проточною водою. Якщо після попадання препарату на шкіру або в очі подразнення після промивання водою не зникає, необхідно звернутися за медичною допомогою.

Не можна гладити тварину і допускати її до маленьких дітей протягом 48 годин після обробки препаратом.

Форма випуску

Пропіленові піпетки 0, 4 мл (Адвантейдж ® 40) та 0,8 мл (Адвантейдж ® 80).

Зберігання

Препарат зберігають у сухому темному, добре вентильованому, приміщенні на стелажах при температурі від 5 до 25 °С.

Зберігати окремо від продуктів харчування та кормів.

Термін придатності

5 років.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Байер Енімал Хелс ГмбХ
D-51368, Леверкузен, Німеччина

Bayer Animal Health GmbH (Germany)
D-51368, Leverkusen

Виробник готового продукту


КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ
Проєнсдорфер стр. 324, D-24106 Кіль,
Німеччина

KVP Pharma+Veterinar Produkte GmbH
(Germany) Projensdorfe Str. 324, D-24106 Kiel

1 0. 0 4. 2019



Advantage®
Для профілактики та лікування інвазії блох у котів та декоративних кроликів масою тіла до 4 кг.
4 x 0,4 мл



до 4 кг

Advantage®
BAYER

Advantage®
BAYER

Advantage®
BAYER

Авантейдж®
Препарат для профілактики та лікування інвазії блох у котів та декоративних кроликів масою тіла до 4 кг.
Авантейдж®
Препарат для профілактики та лікування інвазії блох у котів та декоративних кроликів масою тіла до 4 кг.



4 x 0,4 мл

Спосіб застосування:
Ділячі речовини: Імідазолід 100 мг/мл.
Спосіб застосування: Надуваючий спосіб.
Діючі речовини: Імідазолід 100 мг/мл.

Advantage® Advantage®

(UA)
Авантейдж®
Кролик спот-он для котів та декоративних кроликів масою тіла до 4 кг.
Ектопаразитицид зовнішнього застосування.
Застосування:
Для профілактики та лікування інвазії блох *Ctenocephalides felis* у котів та декоративних кроликів, а також для лікування алергічного блонного дерматиту. Одна обробка захищає тварину від повторної інвазії протягом 4х тижнів.
Дозування:
Для тварин масою тіла до 4 кг застосовувати Авантейдж® 0,4 мл, більше 4 кг – Авантейдж® 0,8 мл.
Спосіб застосування:
Розділіть шерсть на шиї у тварини біля основи черепа так, щоб було видно шкіру. Розмістіть вузький інвазіо-піпетку на шкіру, м'яко стисніть піпетку декілька разів, щоб лось вийшов. Нанесіть пропарат тільки на непероджену шкіру. Не допускати одночасного застосування інших препаратів на шкіру.
Противопоказання:
Не використовувати для кошатків віком до 9ми тижнів. Не використовувати крольчатам віком до 10ми тижнів. Не застосовувати кролям, які призначені для живлення в оці людини.
Зберігання:
Схреще від володів харчування та кормів при температурі від 5° С до 25° С.
Термін придатності:
5 років.
Власник реєстраційного посвідчення:
Байер Енімал Хелс ГмбХ, Лавергузен, Німеччина
Виробник готового продукту:
НВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ, Німеччина
№ РТ в Україні: АА-05099-03-14

(RU)
Авантейдж®
Кролик спот-он для котів та декоративних кроликів масою тіла до 4 кг.
Ектопаразитицид зовнішнього застосування.
Применение:
Для профилактики и лечения инвазии блох *Ctenocephalides felis* у кошек и декоративных кроликов, а также для лечения аллергического блонного дерматита. Одна обработка защищает животное от повторной инвазии в течение 4х недель.
Дозировка:
Для животных массой тела до 4 кг применять Авантейдж® 0,4 мл, больше 4 кг – Авантейдж® 0,8 мл.
Способ применения:
Разделите шерсть на шее у животного у основания черепа так, чтобы было видно кожу. Разместите узкий конец пипетки на кожу, крепко сдавите пипетку несколько раз, чтобы лось содержимое пипетки непосредственно на кожу. Наносите только на неповрежденную кожу. Не допускайте только что обработанных животных вылизывать друг друга.
Противопоказания:
Не использовать котатам до 9ми недельного возраста. Не использовать крольчатам до 10ми недельного возраста. Не применять кролькам, которые предназначены для употребления в пищу людям.
Условия хранения:
Отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 5° С до 25° С.
Срок годности:
5 лет.
Владелец регистрационного свидетельства:
Байер Енімал Хелс ГмбХ, Лавергузен, Германия
Производитель готового продукта:
НВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ, Германия

За додатковою інформацією або зі скаргами звертайтеся за адресою:
ТОВ «БАЙЕР», вул. Яцько-Ват. 64Б, м. Київ, Україна 04071
Тел: +380 44 220 33 42, Факс: +380 44 220 33 40
www.bayer.ua

Bayer

(01)04007221046387

Номер партії / Номер партія:
Дата виготовлення / Дата виготовлення:
Придтий до: Годен до:



10.04.2019



Advantage[®]

Для профілактики та лікування інвазії бліх у котів та декоративних кролів масою тіла понад 4 кг

4 x 0,8 мл

> 4 кг



Advantage[®]

Advantage[®]



Advantage[®]



Advantage[®]

UA

Авантейдж[®]
Кролілі спосіб для котів та декоративних кролів масою тіла понад 4 кг.
Ектопаразитицид зовнішнього застосування.

Застосування:
Для профілактики та лікування інвазії бліх *Ctenocephalides felis* у котів та декоративних кролів, а також для лікування алергічного блішного дерматиту. Одна обробка заміняє тварині від повторної інвазії протягом 4-х тижнів.

Дозування:
Для тварин масою тіла до 4 кг застосовувати Авантейдж[®] 0,4 мл, більше 4 кг – Авантейдж[®] 0,8 мл.

Спосіб застосування:
Розділіть шерсть на ший у тварини біля основи черепа так, щоб було видно шкіру. Розмістіть вузький кінець піпетки на шкіру, м'яко стисніть піпетку декілька разів, щоб вийшла крапля препарату, і нанесіть її на шкіру. Неюкити препарат тільки на негосподарську шкіру. Не допускати щойно обробленої тварини виходити з однієї кімнати.

Протипоказання:
Не використовувати для кошенят віком до 5-ти тижнів. Не використовувати кошенятам віком до 10-ти тижнів. Не застосовувати кролькам, які призначені для виведення в їжу людини.

Зберігання:
Окрім від продукту хаювання та ісома при температурі від 5° С до 25° С.

Термін придатності:
5 років.

Власник реєстраційного посвідчення:
Байер Енімал Хелс ГмбХ, Лавенгаузен, Німеччина

Виробник готового продукту:
НВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ, Німеччина

№ РП в Україні: АА-05099-03-14

За додатковою інформацією або зі скаргами звертайтеся за адресою:
ТОВ «БАЙЕР», вул. Вирхай Вал, 66Б, Київ, Україна 01071
Тел: +380 44 220 33 42, Факс: +380 44 220 33 40
www.registr.gov.ua

RU

Авантейдж[®]
Кролілі спосіб для котів та декоративних кролів масою тіла більше 4 кг.
Ектопаразитицид зовнішнього застосування.

Применение:
Для профилактики и лечения инвазии блох *Ctenocephalides felis* у кошек и декоративных кроликов, а также для лечения аллергического блошиного дерматита. Одна обработка заменяет животному от повторной инвазии в течение 4-х недель.

Дозировка:
Для животных массой тела до 4 кг применять Авантейдж[®] 0,4 мл, больше 4 кг – Авантейдж[®] 0,8 мл.

Способ применения:
Разделите шерсть на шее у животного у основы черепа так, чтобы было видно кожу. Разместите узкий конец пипетки на кожу, крепко сжавте пипетку несколько раз, чтобы вся содержимое нанессти непосредственно на кожу. Наносить только на негосподарственную кожу. Не допускать только что обработанного животного вылизывать друг друга.

Противопоказания:
Не использовать котятм до 5-ми недельного возраста. Не использовать крольчатам до 10-ми недельного возраста. Не применять козлам, которые предназначены для употребления в пищу людям.

Условия хранения:
Отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 5° С до 25° С.

Срок годности:
5 лет.

Владелец регистрационного свидетельства:
Байер Энімал Хелс ГмбХ, Лавенгаузен, Германия

Производитель готового продукта:
НВП Фарма и Ветеринар-Продукт ГмбХ, Германия

Авантейдж[®]
Препарат для профілактики та лікування інвазії бліх у котів та декоративних кролів масою тіла понад 4 кг

Авантейдж[®]
Препарат для профілактики и лечения инвазии бліх у котів та декоративных кролей масою тіла свыше 4 кг



Ctenocephalides felis

Список ветеринарных препаратов для экстренного застосування
Діяча речовина: имидаклоприд 100 мг/мл
Спелера вистар для наружного застосування
Действующее вещество: имидаклоприд 100 мг/мл

4 x 0,8 мл



Bayer

(01)04007221046594

Номер партії/Номер партии:
Дата виготовлення/Дата изготовления:
Придатний до/Годен до:

