

Коротка характеристика препарату

1. Назва

Адвантікс®

2. Склад

100 мл препарату містять діючі речовини:

імідаклоприд – 10,0 г,

перметрин – 50,0 г.

Допоміжні речовини: бутил гідрокситолуол, N-метилпіролідон, міглюл 812, лимонна кислота.

3. Фармацевтична форма

Краплі для зовнішнього застосування.

4. Фармакологічні властивості

ATC vet: QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AC54, перметрин, комбінації)

Адвантікс® – це ектопаразитицид, до складу якого входять діючі речовини імідаклоприд, який має хлорнікотинілову структуру та перметрин - синтетичний піретроїд. Ця комбінація речовин діє як, інсектицид, акарицид та забезпечує репелентну активність препарату. Завдяки такому типу дії препарат знижує ризик захворювання трансмісивними захворюваннями собак (CVBD), такими як бореліоз, рикетсіоз, ерліхіоз, лейшманіоз.

Діюча речовина препарату *Імідаклоприд, 1-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitro-imidazolidin-2-ylideneamine* – ектопаразитицид, що належить до групи хлорнікотинілових сполук. Має високу спорідненість до нікотинергічних ацетилхолінових рецепторів у постсинаптичних ділянках центральної нервової системи бліх. Він приєднується до нікотинергічного рецептора блохи, розміщеного на постсинаптичному нейроні, перериває передачу первого імпульсу, що в подальшому призводить до загибелі паразита.

Слабка взаємодія імідаклоприду з нікотиновими рецепторами ссавців обумовлює низький рівень проникнення через гематоенцефалічний бар’єр, тому імідаклоприд практично не впливає на ЦНС тварин. Імідаклоприд ефективний проти личинок бліх та зрілих особин.

Після місцевого застосування препарату, імідаклоприд швидко розповсюджується по всій шкірі тварини впродовж одного дня після нанесення. Клінічно доведено, що системна абсорбція препарату дуже низька.

Перметрин, - циклопропанкарбоксилова кислота, 3-(2,2-дихлоретил) 2,2-диметил-,(3-феноксифеніл) метилестер - належить до першого класу піретроїдів. Піретроїди викликають порушення електропровідності натрієвих каналців у хребетних та безхребетних. Піретроїди порушують здатність натрієвих каналців до активації та інактивації. Це викликає стан передбудження та тремор, судоми дорсальних м'язів та загиbelь паразита.

Адвантікс® – препарат для зовнішнього застосування, після нанесення на шкіру швидко розподіляється по всій поверхні тіла тварини.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Собаки.

5.2 Показання до застосування

Профілактика та лікування собак при ураженні кліщами (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor* spp.), блохами (*Ctenocephalides* spp.), волосоїдами (*Trichodectes canis*). Відлякування москітів, комарів та мух у собак.

Одноразова обробка захищає тварин від ураження блохами і кліщами до 4-х тижнів (*Dermacentor* spp. – до 3-х).

Препарат також можна застосовувати для лікування алергічного блошиного дерматиту.

Препарат знижує ризик зараження собак збудником ерліхіозу *Ehrlichia canis*. Кліщі, що були на тварині до обробки, можуть залишатися ще до 2 діб після обробки препаратом. Рекомендовано видалити кліщів перед обробкою препаратом.

Одноразова обробка забезпечує репелентну дію відносно:

- комарів та москітів *Phlebotomus perniciosus*, *Culex pipiens* впродовж 4-х тижнів,
- Phlebotomus papatasi* та *Aedes aegypti* протягом 2-х тижнів,
- мух *Stomoxys calcitrans* - 4 тижні.

5.3 Протипоказання

З-за відсутності доступних даних, препарат не має використовуватися цуценятам віком до 7-ми тижнів або якщо вага складає менше ніж 1,5 кг.

Не застосовувати тваринам з відомою гіперчутливістю до складових препарату.

Не застосовувати котам.

5.4 Побічна дія

У дуже рідких випадках застосування препарату може викликати короткочасне подразнення шкіри (свербіж, почервоніння), пригнічення, які самовільно проходять.

У дуже рідких випадках у собак може бути змінена поведінка (збудження, виття, розлади руху), розлади з боку ШКТ (рвота, діарея, слизовиділення, зниження апетиту) та неврологічні симптоми, такі як: нестабільний рух та судоми у собак, що чутливі до діючої речовини перметрину. Вказані розлади тимчасові і зникають самовільно.

Отруєння, що викликано випадковим проковтуванням препарату у собак малоймовірне але в дуже рідких випадках можливе. В цьому випадку можливі такі ознаки як судоми та в'ялість. Лікування має бути симптоматичним. Специфічні антидоти не відомі.

5.5 Особливі застереження при використанні

Немас.

5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Може застосовуватися під час вагітності та лактації.

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Невідомо.

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Мінімальна рекомендована доза препарату - 10 мг імідаклоприд та 50 мг перметрину на 1 кг маси тіла. Відповідно до маси тіла тварин рекомендується застосовувати відповідні піпетки препарату:

Собаки масою тіла, кг	Торгова назва	Об'єм, мл	Імідаклоприд (мг/кг м.т.)	Перметрин (мг/кг м.т.)
до 4	Адвантікс® (для собак масою тіла до 4 кг)	0,4	мінімум 10	мінімум 50
4 - 10	Адвантікс® (для собак м. т. від 4 кг до 10 кг)	1,0	10-25	50-125
10 - 25	Адвантікс® (для собак м. т. від 10 кг до 25 кг)	2,5	10-25	50-125
25 - 40	Адвантікс® (для собак м. т. від 25 кг і більше)	4,0	10-16	50-80
40-60	Адвантікс® (для собак м. т. від 40 кг до 60кг)	6,0	10-15	50-75

Для собак масою тіла більше 60 кг необхідно використовувати відповідну комбінацію піпеток.


Для уникнення перезараження собак, рекомендована обробка всіх собак, що знаходяться в помешканні. Інші види тварин, що живуть в помешканні, мають бути також оброблені безпечною та ефективними препаратами. Також рекомендована обробка навколошнього середовища проти всіх стадій паразитів.

Препарат залишається ефективний при намоканні шерсті тварини, однак залежно від присутності бліх у зовнішньому середовищі, допускається додаткова обробка. У таких випадках препарат можна застосовувати не частіше, ніж 1 раз на тиждень.

Купати собак із застосуванням шампуню можна перед обробкою препаратом Адвантікс®, або через 2 тижні після обробки.

Спосіб застосування:

Вийміть піпетку з упаковки, у вертикальному положенні зніміть ковпачок, переверніть його та одягніть на піпетку, таким чином видаливши пломбу та зніміть ковпачок.



При обробці тварини повинні стояти.

Собаки до 10 кг:

Розділіть шерсть між лопатками так, щоб було видно шкіру. Препарат наноситься на непошкоджену шкіру. Розмістіть вузький кінець піпетки на шкіру, міцно стисніть піпетку декілька разів, і нанесіть весь вміст безпосередньо на шкіру.



Собаки більше 10 кг:

Препарат наносять у 3–4 точки вздовж хребта, починаючи між лопатками і закінчуючи біля кореня хвоста. При кожному нанесенні потрібно розгорнути шерсть таким чином, щоб було видно шкіру.

Препарат наноситься на непошкоджену шкіру. Розмістіть кінчик піпетки на шкіру та обережно стисніть піпетку і рівномірно нанесіть вміст піпетки вздовж хребта. При нанесенні препарату на шкіру уникайте попадання препарату в одне місце та не допускайте можливість злизування твариною нанесеного засобу.



5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Передозування препарату у 5 разів від рекомендованої дози не викликало ніяких симптомів передозування у цуценят та дорослих собак, а також у цуценят, матері яких отримали 3х кратне передозування препаратом.

5.10 Спеціальні застереження

При обробці тварин уникати попадання препарату в очі та всередину (травний канал).

10.04.2019

Не використовувати для обробки котів!

Цей продукт є надзвичайно отруйним для котів та може бути смертельним завдяки специфічним фізіологічним особливостям котів, завдяки яким вони не здатні метаболізувати деякі компоненти, включаючи перметрин. Для запобігання випадкового вживання продукту котами, тримайте оброблених собак недосяжно для котів до повного висихання продукту в місці нанесення.



5.11 Період виведення (каренція)

Для непродуктивних тварин не регламентується.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Уникайте контакту продукту з шкірою, очима та губами.

Під час роботи з препаратом не дозволяється палити, пити і приймати їжу. Обробку тварин рекомендується проводити у захисних рукавицях.

Після закінчення роботи необхідно вимити руки теплою водою з милом.

При випадковому попаданні препарату на шкіру або слизові оболонки його необхідно відразу промити проточною водою. Якщо після попадання препарату на шкіру або в очі подразнення після промивання водою не зникає, необхідно звернутися за медичною допомогою.

Оброблені препаратом собаки не мають контактувати з дітьми до повного висихання продукту на місці введення. Як рекомендація, для виконання цієї умови, рекомендована вечірня обробка тварини, наприклад. Щойно оброблені препаратом тварини не мають спати з власниками, особливо з дітьми!

Розчинник, що входить до складу Адвантікс®, може залишати плями на таких матеріалах як шкіра, тканини, пластик та інші поверхні. Тому після обробки тварин намагайтесь не допускати контакту тварини з подібними матеріалами до повного висихання шерсті.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності (основні)

Невідомі.

6.2 Термін придатності

5 років.

3 роки – для Адвантікс® для собак масою тіла від 40 кг до 60 кг.

6.3 Особливі заходи зберігання

Препарат зберігають у сухому темному, добре вентильованому приміщенні, на стелажах при температурі від 5 до 25°C.

Зберігати окремо від продуктів харчування та кормів.

6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування

Білі пропіленові піпетки з пластиковими кришечками по 0,4 мл (Адвантікс® для собак масою тіла до 4 кг), 1,0 мл (Адвантікс® для собак масою тіла 4-10 кг), 2,5 мл (Адвантікс® для собак масою тіла 10-25 кг), 4,0 мл (Адвантікс® для собак масою тіла від 25 кг і більше), 6,0 мл (Адвантікс® для собак масою тіла від 40 кг до 60 кг) запаковані в індивідуальні алюмінієві упаковки.

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний препарат та тара повинні бути знешкоджені у відповідності з національними вимогами.

Не допускати попадання препарату у водойми, оскільки він небезпечний для риби.

7. Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення

Байер Енімал Хелс ГмбХ
D-51368, Леверкузен, Німеччина

Bayer Animal Health GmbH (Germany)
D-51368, Leverkusen

10.04.2019

8. Назва і місце знаходження виробника

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ
Проенсдорфер стр. 324, D-24106 Кіль,
Німеччина

KVP Pharma+Veterinar Produkte GmbH
(Germany) Projensdorfe Str. 324, D-24106 Kiel

9. Додаткова інформація

10.04.2010

Адвантікс®
(краплі для зовнішнього застосування)
листівка–вкладка

Опис

Прозорий розчин від жовтого до коричневого кольору.

Склад

100 мл препарату містять діючі речовини:

імідаклоприд – 10,0 г,

перметрин – 50,0 г.

Допоміжні речовини: бутил гідрокситолуол, N-метилпіролідон, мігліол 812, лимонна кислота.

Фармакологічні властивості

ATC vet: QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AC54, перметрин, комбінації)

Адвантікс® – це ектопаразитицид, до складу якого входять діючі речовини: імідаклоприд, який має хлорнікотинілову структуру та перметрин – синтетичний піретроїд. Ця комбінація речовин діє як,

інсектицид, акарицид та забезпечує репелентну активність препарату. Завдяки такому типу дії препарат знижує ризик захворювання трансмісивними захворюваннями собак (CVBD), такими як бореліоз, рикетсіоз, ерліхіоз, лейшманіоз.

Діюча речовина препарату *Імідаклоприд*, 1-(6-Chloro-3- pyridylmethyl)-N-nitro-imidazolidin-2-ylideneamine – ектопаразитицид, що належить до групи хлорнікотинілових сполук. Має високу спорідненість до нікотинергічних ацетилхолінових рецепторів у постсинаптичних ділянках центральної нервової системи бліх. Він приєднується до нікотинергічного рецептора блохи, розміщеного на постсинаптичному нейроні, перериває передачу нервового імпульсу, що в подальшому призводить до загибелі паразита. Слабка взаємодія імідаклоприду з нікотиновими рецепторами ссавців обумовлює низький рівень проникнення через гематоенцефалічний бар’єр, тому імідаклоприд практично не впливає на ЦНС тварин. Імідаклоприд ефективний проти личинок бліх та зрілих особин.

Після місцевого застосування препарату імідаклоприд швидко розповсюджується по всій шкірі тварини впродовж одного дня після нанесення. Клінічно доведено, що системна абсорбція препарату дуже низька.

Перметрин – циклопропанкарбоксилова кислота, 3-(2,2-дихлоретил) 2,2-диметил-, (3-феноксиfenіл) метилестер – належить до першого класу піретроїдів. Піретроїди викликають порушення електропровідності натрієвих каналців у хребетних та безхребетних. Піретроїди порушують здатність натрієвих каналців до активації та інактивації. Це викликає стан перезбудження та тремор, судоми дорсальних м’язів та загиbelь паразита.

Адвантікс® – препарат для зовнішнього застосування, після нанесення на шкіру швидко розподіляється по всій поверхні тіла тварини. Ефективність обох діючих речовин на шкірі та шерсті тварин триває протягом 4-х тижнів.

Застосування

Профілактика та лікування собак при ураженні кліщами (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor* spp.), блохами (*Ctenocephalides* spp.), волосоїдами (*Trichodectes canis*). Відлякування москітів, комарів та мух у собак.

Одноразова обробка захищає тварин від ураження блохами і кліщами до 4-х тижнів (*Dermacentor* spp. – до 3-х).

Препарат також можна застосовувати для лікування алергічного блошиного дерматиту.

10.04.2019

Препарат знижує ризик зараження собак збудником ерліхіозу *Ehrlichia canis*. Кліщі, що були на тварині до обробки, можуть залишатися ще до 2 діб після обробки препаратом. Рекомендовано видалити кліщів перед обробкою препаратом.

Одноразова обробка забезпечує репелентну дію відносно:

- комарів та москітів *Phlebotomus perniciosus*, *Culex pipiens* впродовж 4-х тижнів,
- Phlebotomus papatasi* та *Aedes aegypti* протягом 2-х тижнів,
- мух *Stomoxys calcitrans* - 4 тижні.

Дозування

Мінімальна рекомендована доза препарату - 10 мг імідаклоприду та 50 мг перметрину на 1 кг маси тіла. Відповідно до маси тіла тварин рекомендується застосовувати відповідні піпетки препарату:

<i>Собаки масою тіла, кг</i>	<i>Торгова назва</i>	<i>Об'єм, мл</i>	<i>Імідаклоприд (мг/кг м.т.)</i>	<i>Перметрин (мг/кг м.т.)</i>
до 4	Адвантікс® (для собак масою тіла до 4 кг)	0,4	мінімум 10	мінімум 50
4 - 10	Адвантікс® (для собак м. т. від 4 кг до 10 кг)	1,0	10-25	50-125
10 - 25	Адвантікс® (для собак м. т. від 10 кг до 25 кг)	2,5	10-25	50-125
25 - 40	Адвантікс® (для собак м. т. від 25 кг і більше)	4,0	10-16	50-80
40-60	Адвантікс® (для собак м. т. від 40 кг до 60кг)	6,0	10-15	50-75

Для собак масою тіла більше 60 кг необхідно використовувати відповідну комбінацію піпеток.

Для уникнення перезараження собак, рекомендована обробка всіх собак, що знаходяться в помешканні. Інші види тварин, що живуть в помешканні, мають бути також оброблені безпечними та ефективними препаратами. Також рекомендована обробка навколошнього середовища проти всіх стадій паразитів.


Препарат залишається ефективний при намоканні шерсті тварини, однак залежно від присутності бліх у зовнішньому середовищі, допускається додаткова обробка. У таких випадках препарат можна застосовувати не частіше, ніж 1 раз на тиждень.

Купати собак із застосуванням шампуню можна перед обробкою препаратом Адвантікс®, або через 2 тижні після обробки.

Спосіб застосування:

Вийміть піпетку з упаковки, у вертикальному положенні зніміть ковпачок, переверніть його та одягніть на піпетку, таким чином видаливши пломбу та зніміть ковпачок.

10.04.2019



При обробці тварини повинні стояти.

Собаки до 10 кг:

Розділіть шерсть між лопатками так, щоб було видно шкіру. Препарат наноситься на непошкоджену шкіру. Розмістіть вузький кінець піпетки на шкіру, міцно стисніть піпетку декілька разів, і нанесіть весь вміст безпосередньо на шкіру.



Собаки більше 10 кг:

Препарат наносять у 3–4 точки вздовж хребта, починаючи між лопатками і закінчуєчи біля кореня хвоста. При кожному нанесенні потрібно розгорнути шерсть таким чином, щоб було видно шкіру.

Препарат наноситься на непошкоджену шкіру. Розмістіть кінчик піпетки на шкіру та обережно стисніть піпетку і рівномірно нанесіть вміст піпетки вздовж хребта. При нанесенні препарату на шкіру уникайте попадання препарату в одне місце та не допускайте можливість злизування твариною нанесеного засобу.



Протипоказання

З-за відсутності доступних даних, препарат не має використовуватися цуценятам віком до 7-ми тижнів або якщо вага складає менше ніж 1.5 кг.

Не застосовувати тваринам з відомою гіперчутливістю до складових препарату.

Не застосовувати котам.



Застереження

Уникайте контакту продукту з шкірою, очима та губами.

Під час роботи з препаратом не дозволяється палити, пити і приймати їжу.

Обробку тварин рекомендується проводити у захисних рукавицях.

Після закінчення роботи необхідно вимити руки теплою водою з мілом.

При випадковому попаданні препарату на шкіру або слизові оболонки його необхідно відразу промити проточною водою. Якщо після попадання препарату на шкіру або в очі подразнення після промивання водою не зникає, необхідно звернутися за медичною допомогою.

10.04.2019

Оброблені препаратом собаки не мають контактувати з дітьми до повного висихання продукту на місці введення. Як рекомендація, для виконання цієї умови, рекомендована вечірня обробка тварини, наприклад. Щойно оброблені препаратом тварини не мають спати з власниками, особливо з дітьми!

Розчинник, що входить до складу Адвантікс® , може залишати плями на таких матеріалах як шкіра, тканини, пластик та інші поверхні. Тому після обробки тварин намагайтесь не допускати контакту тварини з подібними матеріалами до повного висихання шерсті.

Форма випуску

Білі пропіленові піпетки з пластиковими кришечками по 0,4 мл (Адвантікс® для собак масою тіла до 4 кг), 1,0 мл (Адвантікс® для собак масою тіла 4–10 кг), 2,5 мл (Адвантікс® для собак масою тіла 10–25 кг), 4,0 мл (Адвантікс® для собак масою тіла 25–40 кг), 6,0 мл (Адвантікс® для собак масою тіла 40–60 кг) запаковані в індивідуальні алюмінієві упаковки.

Зберігання

Препарат зберігають у сухому темному, добре вентильованому приміщенні при температурі від 5 до 25° С.

Зберігати окремо від продуктів харчування та кормів.

Термін придатності

5 років.

3 роки – для Адвантікс® для собак масою тіла від 40 кг до 60 кг.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Байер Енімал Хелс ГмбХ
D-51368, Леверкузен, Німеччина

Bayer Animal Health GmbH (Germany) D-51368,
Leverkusen

Виробник готового продукту

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ
Проенсдорфер стр. 324, D-24106 Кіль,
Німеччина

KVP Pharma+Veterinar Produkte GmbH
(Germany) Projensdorfe Str. 324, D-24106 Kiel

10.04.2019



10.04.2019



10.04.2019



10.04.2019



10.04.2019

Advantix®

Адвантикс®
для собак масою тіла від 40 до 60 кг
Адвантикс®
для собак масою тіла від 40 до 60 кг

4x 6,0 мл

40-60 кг

105 x 25 x 195

Advantix®

Адвантикс®
для собак масою тіла від 40 до 60 кг

Кролі для живіального застосування.
Не застосовувати котам.

Застосування та дозування:
Профілактика та лікування собак при ураженні кліщами (жовті ліни, Rhipicephalus конго, Rhipicephalus sanguineus, Ixodes canis), блоками (Ixodes holocyclus), комарів (Tabanus corynatus), москітів (Aedes vexans) та мух (Musca domestica).
Одноразова доза фарбуза застосування блоками та кліщами в розмір 4-х пільз.
Одноразове застосування для собак масою тіла понад 40 кг (від 40 до 60 кг) складається з 4 пільз (400 мг феноклопрілу, 50 мг індіклопрілу).
Для собак масою тіла більше 60 кг застосування відповідає суміші пільз.

Адвантикс® може ефективно використовуватися для лікування антигельминтного діагносту.

Спосіб застосування:
спот-он (для лісистину-інкаладу).

Advantix®

Адвантикс®
для собак масою тіла від 40 до 60 кг

Для профілактики і лікування ураження собак кліщами і блоками, відлякування комарів, москітів і мух від собак.

Адвантикс®
для собак масою тіла
от 40 до 60 кг

Для профілактики і лічення пораження собак кліщами і блоками, отпугування комарів, москітів і мух від собак.

Склад:
Індіклопріл 100 мг/пільза
Парметрін 500 мг/пільза
Состав: Індіклопріл 100 мг/пільза
Парметрін 500 мг/пільза

4x 6,0 мл

Bayer

Брайер

Адвантикс®
для собак масою тіла
от 40 до 60 кг

Капли для наружного застосування.
Не применять котам.

Применение и дозировка:
Профилактика и лечение собак при поражении клещами (желтые львы, Rhipicephalus конго, Rhipicephalus sanguineus, Ixodes canis), блохами (Ixodes holocyclus) комарами (Tabanus corynatus), комариками (Aedes vexans) и мухами (Musca domestica), а также для отпугивания москитов, комаров и мух от собак.

Одноразовая обработка защищает от поражения блекими и красными клещами в течение 4-х недель. Одноразовое применение для собак массой тіла від 40 до 60 кг (від 40 до 60 кг) складається з 4 капель (400 мг феноклоприда, 50 мг индиклоприда). Для собак массою тіла від 60 кг вводится двойное применение соответствующей концентрации гипотез.

Адвантикс® может использоваться при лечении аллергического блошиного дерматита.
Способ применения:
спот-он (на листину-инкаладу).

Advantix®

Противопоказания:
Не применять для щенков возрастом до 7-ми недель, а также телятам с избыточной гиперчувствительностью к составляющим препарата.

Условия хранения:
В недоступном для детей и животных месте, в сухом, защищенном от света, недоступном для детей и животных месте, отдалено от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 °C до 25 °C.

Виробник реєстраційного посвідчення:
Байєр Енком Глоб. ГмбХ, D-51368
Левенгаузен, Німеччина

Виробник готового продукту:
КВІ Фарма і Ветерінар-Групдукт ГмбХ,
Німеччина, Просдорфстр. 324,
D-24105 Киль
МР в Україні: АА-05098-03-14

Фармакологічна категорія та обсяг захисту
із антигельмінтними властивостями
100-БА №Р-2014-04-00000, вул. Бориса Году, 4, 6-й, кв. 1, Харків, Україна 64011
Тел.: +380 44 225 33 42, Факс: +380 44 225 33 43
www.eclipsukr.net

Серія №/Серія №:
Дата виготовлення/Дата прописаності:
Проданий до/Бордінг

(0)04007221048947

Bayer

Брайер

1. NAME OF THE VETERINARY MEDICINAL PRODUCT

Advantix Spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg

2. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION

Active substances:

Imidacloprid: 100 mg/ml
Permethrin: 500 mg/ml

Excipient(s):

Butylhydroxytoluene (E321): 1.0 mg/ml

For a full list of excipients, see section 6.1.

3. PHARMACEUTICAL FORM

Spot-on solution

Clear yellowish to brownish solution

4. CLINICAL PARTICULARS

4.1 Target species

Dogs (over 25 kg up to 40 kg)

For dogs less than or equal to 25 kg or more than 40 kg body weight, use the appropriate Advantix Spot-on solution product or combination of products (see section 4.9).

4.2 Indications for use, specifying the target species

For the treatment and prevention of flea (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*) infestation.

Fleas on dogs are killed within one day following treatment. One treatment prevents further flea infestation for four weeks. The product can be used as part of a treatment strategy for flea allergy dermatitis (FAD).

For the treatment of biting lice (*Trichodectes canis*).

The product has persistent acaricidal and repellent efficacy against tick infestations (*Rhipicephalus sanguineus* and *Ixodes ricinus* for four weeks, and *Dermacentor reticulatus* for three weeks).

By repelling and killing the tick vector *Rhipicephalus sanguineus*, the product reduces the likelihood of transmission of the pathogen *Ehrlichia canis*, thereby reducing the risk of canine ehrlichiosis. The reduction in risk has been shown in studies to commence from 3 days following application of the product and to persist for 4 weeks.