



РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України “Про ветеринарну медицину”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1349 “Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів” та на підставі експертного висновку від 18.04.2018 № 1372-К/06, рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, наказу Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів від 25.04.2018 р. № 346 зареєстровано:

препарат

Адвокат® для котів

форма

Краплі для зовнішнього застосування

Власник реєстраційного посвідчення:

*Байер Енімал Хелс ГмбХ
D-51368, Леверкузен
Німеччина*

зареєстровано в Україні за №

AA-04159-01-13

від

25.04.2018

Виробник:

*КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ,
Проєнсдорфер стр. 324, D-24106 Кіль, Німеччина*

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка (додаток 2)
- етикетка (додаток 3);

Реєстраційне посвідчення дійсне до

24.04.2023

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного препарату



МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Державний науково-дослідний контрольний
інститут ветеринарних препаратів
та кормових добавок

Національне агентство ветеринарних
препаратів та кормових добавок

79019, м. Львів, вул. Донецька, 11
Тел.: (032) 252-82-84; факс: (032) 252 -11-93
www.scivp.lviv.ua e-mail:NAVPPFA@ukr.net



MINISTRY OF AGRICULTURAL POLICY
AND FOOD OF UKRAINE

State scientific-research control institute
of veterinary medicinal products
and feed additives

National agency of veterinary medicinal
Products and feed additives

Donetska str.,11, Lviv 79019, Ukraine
tel.: (380 32) 252-82-84; fax: (380 32) 252-11-93
www.scivp.lviv.ua e-mail: NAVPPFA@ukr.net

18.04.2018 № 1372-K/06

Директору Департаменту безпеки
харчових продуктів та ветеринарної
медицини Держпродспоживслужби України
Кобалю Б.І.

ТОВ «БАЙЕР», Україна
за дорученням фірми Байер Енімал Хелс
ГмбХ (Німеччина)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

препарату

Адвокат® для котів

власник Байер Енімал Хелс ГмбХ (Німеччина)

виробник КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ (Німеччина)

згідно з контрактом № 22 від 02.02.2018 р.

За результатами проведеної наукової експертизи реєстраційного досьє та випробувань препарату Адвокат® для котів, краплі для зовнішнього застосування, власник Байер Енімал Хелс ГмбХ (Німеччина), виробник КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ (Німеччина) рекомендовано його перереєстрацію в Україні.

Реєстраційне посвідчення: АА-04159-01-13

Директор Інституту,
д.в.н., професор,
академік НААН

Голова Агентства, д.б.н.

І.Я. Коцюмбас

Ю.М. Косенко

Коротка характеристика препарату

1. Назва

Адвокат® для котів.

2. Склад

1 мл препарату містить діючі речовини:

імідаклоприд – 100 мг;

моксидектин – 10 мг.

Допоміжні речовини: бензиловий спирт, бутилгідрокситолуен (Е 321), пропілен карбонат.

3. Фармацевтична форма.

Краплі для зовнішнього застосування.

4. Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код: QP53A, ектопаразитарні ветеринарні препарати для місцевого застосування (QP54AB02 - моксидектин, QP53AX17 - імідаклоприд)

Адвокат® для котів – це екто- і ендopаразитоцид зовнішнього застосування. Фармакологічні властивості препарату зумовлені властивостями діючих речовин.

Імідаклоприд – ектопаразитоцид, належить до групи хлорнікотинілових сполук. Він перериває передачу нервового імпульсу у паразита, що в подальшому призводить до його паралічу та загибелі. Імідаклоприд практично не впливає на ЦНС ссавців.

Моксидектин належить до другого покоління макроциклічних лактонів групи мільбеміцинів. Діюча речовина проявляє вплив проти багатьох енто- і ектопаразитів. Моксидектин взаємодіє з гама-аміно-масляною кислотою та з глутаровими хлорними каналцями паразитів. Внаслідок чого відбувається незворотне зниження м'язової активності, параліч та загибель паразитів.

Фармакокінетика

Після зовнішнього застосування імідаклоприд поширюється по всій поверхні тіла тварини впродовж однієї доби. Моксидектин абсорбується через шкіру і розповсюджується системно, досягаючи максимальної концентрації в плазмі крові через 1-2 доби. Моксидектин виводиться з організму повільно протягом 1 місяця.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Коти та тхори.

5.2 Показання до застосування

Лікування та профілактика котів при ураженні блохами (*Ctenocephalides felis*); лікування отодектозу (*Otodectes cynotis*) танотоедрозу (*Notoedres cati*); лікування кишечних (*Toxocara cati* і *Ancylostoma tubaeforme*) і легеневих (*Eucoleus aerophilus* / syn. *Capillaria aerophila*) нематодозів; профілактика дирофіляріозу (*Dirofilaria immitis*: мікродирофілярії L3 та L4 стадії).

Препарат може використовуватись як один із засобів при лікуванні алергічного блошиного дерматиту.

Показання до застосування котам	Лікування	Профілактика
Сифонаптерози: блохи (<i>Ctenocephalides felis</i>)	✓	✓
Акарози: отодектоз (<i>Otodectes cynotis</i>), номоедроз (<i>Notoedres cati</i>)	✓	
Аскарідатози: <i>Toxocara cati</i> (личинки L4 стадії, молоді та статевозрілі нематоди)	✓	
Стронгілятози: <i>Ancylostoma tubaeforme</i> (личинки L4 стадії, молоді та статевозрілі нематоди)	✓	
Трихуратози органів дихання: <i>Eucoleus aerophilus</i> / syn. <i>Capillaria aerophila</i> (статевозрілі)	✓	
Філяріатози: дирофілярії <i>Dirofilaria immitis</i> (мікродирофілярії L3 та L4 стадії)		✓

25.04.2018

Лікування та профілактика тхорів при ураженні блохами (*Ctenocephalides felis*), а також профілактика дирофіляріозу (*Dirofilaria immitis*: мікродирофілярії L3 та L4 стадії).

5.3 Протипоказання

Не застосовувати тваринам з гіперчутливістю до складників препарату.

Для котів: кошенятам віком до 9-ти тижнів; застосування препарату тваринам масою тіла до 1 кг повинно ґрунтуватися на оцінці ризику та необхідності лікування.

Для тхорів: не застосовувати препарат Адвокат® для котів фасуванням для великих котів (0,8 мл), або препарат Адвокат® для собак. Лікування тварин масою тіла до 0,8 кг повинно ґрунтуватися на оцінці ризику та необхідності лікування.

Не використовувати для лікування канарок.

5.4 Побічна дія

Після застосування препарату у котів можливий короточасний свербіж, у рідких випадках спостерігають еритему, ознаки засалювання шерсті, блювоту. Ці прояви швидко минають без лікування.

У тварин, які випадково злизали препарат відразу після нанесення, можуть виникнути ознаки нервових розладів (атаксія, генералізований тремор, розширення зіниць, нистагми), порушення дихання, посилене слиновиділення та блювота. Ці ознаки зникають через декілька хвилин без додаткового лікування.

Продукт гіркий на смак, тому саливація, що виникає після злизування препарату, не є ознакою інтоксикації і зникає через декілька хвилин без лікування. Правильне нанесення препарату мінімізує можливість злизування препарату.

В дуже рідких випадках застосування препарату може стати причиною тимчасових змін у поведінці тварини, таких як млявість, збудження та відсутність апетиту.

5.5 Особливі застереження при використанні у тварин

Часте застосування шампуню може зменшити ефективність препарату. Купання тварин 1-2 рази у період між щомісячними обробками тварин препаратом Адвокат® для котів не впливає на ефективність препарату.

Ефективність препарату Адвокат® для котів не тестувалась на тхорах масою тіла більше 2 кг, тому тривалість дії препарату може бути меншою у цих тварин.

Часте та повторне використання екто- і ендопаразитоцидів будь-якого класу може призвести до виникнення резистентності до діючої речовини. Використання препаратів має бути призначене після проведення оцінки доцільності призначення препарату.

5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Препарат не досліджувався на вагітних та лактуючих тваринах.

Лабораторні дослідження імідаклоприду та моксидектину на щурах та кроликах не дали тератогенних, фетотоксичних або матково-токсичних ефектів.

Використовувати тільки після призначення ветеринарним лікарем.

5.7 Взаємодія з іншими засобами або інші форми взаємодії

Не застосовувати одночасно з іншими проти паразитарними макроциклічними лактонами.

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Мінімальна рекомендована доза імідаклоприду - 10 мг/кг маси тіла, моксидектину - 1,0 мг/кг маси тіла, що еквівалентно 0,1 мл Адвокату® для котів на 1 кг маси тіла тварини.

Схема дозування Адвокату® для котів та тхорів:

Маса тіла тварин (кг)	Розмір піпетки	Об'єм, (мл)	Імідаклоприд (мг/кг маси тіла)	Моксидектин (мг/кг маси тіла)
≤ 4 кг	Адвокат® для маленьких котів та тхорів	0,4	Мінімум 10	Мінімум 1
> 4 - 8 кг	Адвокат® для великих котів	0,8	10-20	1-2
>8 кг	Відповідна комбінація піпеток			

Коти:

Лікування та профілактика сифонаптерозу (ураження блохами)

Одноразова обробка попереджає зараження блохами впродовж 4-х тижнів. Доцільно поєднувати обробку тварини препаратом Адвокат® для котів з обробкою місць перебування тварин з метою переривання життєвого циклу бліх. При лікуванні алергічного блошиного дерматиту препарат рекомендується застосовувати щомісяця.

Лікування отодектозу

Одноразове застосування. Можлива повторна обробка через 30 діб. Не наносити препарат безпосередньо у вушний канал.

Лікування нотоєдрозу

Одноразове застосування.

Лікування та профілактика кишечних і легеневих нематодозів

Щомісячна обробка тварин препаратом знижує можливість зараження нематодами. Препарат також використовують у період профілактичного карантинування (за результатами дослідження проб калу), при планових та сезонних дегельмінтизаціях котів проти кишечних та легеневих нематодозів.

Профілактика дирофіляріозу

Препарат застосовують за 1 місяць до очікуваної активності кровосисних комах, впродовж усього періоду активності та ще місяць після завершення їхньої активності, або протягом усього року. Обробку тварин рекомендується проводити щомісяця в один і той же день. Якщо тварині застосовували інший препарат, який захищає від мікродирофілярій, Адвокат® для котів можна застосовувати через 1 місяць після обробки попереднім препаратом.

Тхорі:


Лікування та профілактика сифонаптерозу (ураження блохами)

Застосування препарату попереджає зараження блохами впродовж 3-х тижнів. При високій активності бліх у зовнішньому середовищі рекомендується повторна обробка через 2 тижні.

Профілактика дирофіляріозу

Препарат застосовують за місяць до очікуваної активності кровосисних комах, впродовж усього періоду активності та ще місяць після завершення їхньої активності, або впродовж усього року. Обробку тварин рекомендується проводити щомісяця в один і той же день.

Спосіб застосування



Препарат застосовують лише зовнішньо. Взяти одну піпетку з упакування. Тримаючи піпетку у вертикальному положенні, відкрутити і зняти ковпачок. Далі перевернути ковпачок, одягнути його на піпетку, і відкрити видаливши фольгу.

У ділянці шиї біля основи черепа розділити шерсть тварини, щоб видно було шкіру. Розмістити кінець піпетки на шкіру, міцно стиснути піпетку декілька разів, нанести весь вміст безпосередньо на шкіру. Наносити препарат на непошкоджену шкіру.

5.9 Передозування

При випадковому заковтуванні препарату твариною застосовувати симптоматичне лікування. Рекомендується активоване вугілля.

5.10 Спеціальні застереження

Лікування котів масою тіла до 1 кг та тхорів до 0,8 кг повинно базуватися на оцінці ризику вигоди.

Існує обмежений досвід використання продукту хворим та ослабленим тваринам, тому лікування повинно базуватися на оцінці ризику вигоди.

Не допускати потрапляння препарату в очі та до ротової порожнини тварин. Не дозволяти щойно обробленим тваринам облизувати одне одного.

Оскільки використання препарату тваринам, ураженим дорослими дирофіляріями, може призвести до серйозних побічних наслідків, включаючи загибель тварини, то перед застосуванням препарату необхідно провести діагностику котів та тхорів віком старше 6 місяців на дирофіляріоз (статевозрілі паразити). Якщо діагноз підтверджується, то тварин необхідно лікувати щодо дирофіляріозу згідно з короткою характеристикою препарату (п. 5.8).

5.11 Період виведення (каренція)

Для непродуктивних тварин період виведення не визначається.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу.

Під час обробки тварин не можна палити, пити і приймати їжу.

Уникати попадання препарату на шкіру, в очі, у ротову порожнину. При випадковому попаданні препарату на шкіру, слизові оболонки або очі необхідно ретельно промити їх проточною водою. Якщо подразнення шкіри або очей не проходить, або препарат випадково був заковтнутий, необхідно звернутися до лікаря і показати листівку-вкладку або етикетку препарату.

Після роботи з препаратом необхідно ретельно вимити руки.

Люди із гіперчутливістю до складників препарату Адвокат® для котів повинні наносити препарат з обережністю.

У дуже рідких випадках препарат може викликати місцеві реакції (свербіж, почервоніння), що швидко минають.

Після застосування препарату не можна стригти тварин до повного висихання препарату на шкірі. Розчинник, що входить до складу Адвокату® для котів, може залишати плями та псувати такі матеріали як шкіра, тканини, пластик та інші. Якщо тварини утримуються у квартирі і мають доступ до меблів, то після обробки їх необхідно утримувати окремо до повного висихання препарату на шкірі.

Не допускати щойно оброблених тварин облизувати себе та одне одного.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності (основні)

Невстановлені.

6.2 Термін придатності

3 роки.

6.3 Особливі заходи зберігання

Зберігати препарат у закритому упакуванні виробника в сухому недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 0 до 30 °С.

6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування

Піпетки по 0,4 та 0,8 мл запаковані в блістери по 3, 4, 6, 21 або 42 штуки. Пакувальний матеріал: білі поліпропіленові туби з ковпачками.

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками.

Невикористаний препарат та тара повинні бути знешкоджені у відповідності з національними вимогами.

Препарат Адвокат® для котів шкідливий для риб та водних організмів.

7. Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Байер Енімал Хелс ГмбХ,
D-51368, Леверкузен
Німеччина

Bayer Animal Health GmH
D-51368, Leverkusen
Germany

25.04.2018

8. Назва та місцезнаходження виробника (виробників)

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ,
Проєнсдорфер стр. 324, D-24106 Кіль,
Німеччина

KVP Pharma+Veterinar Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel
Germany

9. Додаткова інформація

Адвокат® для котів
(краплі для зовнішнього застосування)
листівка-вкладка

Опис

Прозорий розчин.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини:

імідаклоприд – 100 мг;

моксидектин – 10 мг.

Допоміжні речовини: бензиловий спирт, бутилгідрокситолуен (Е 321), пропілен карбонат.

Фармакологічна дія

АТС vet: QP53A, ектопаразитарні ветеринарні препарати для місцевого застосування (QP54AB02 - моксидектин, QP53AX17 - імідаклоприд)

Адвокат® для котів – це екто- і ендopаразитоцид зовнішнього застосування. Фармакологічні властивості препарату зумовлені властивостями діючих речовин.

Імідаклоприд – ектопаразитоцид, належить до групи хлорнікотинілових сполук. Він перериває передачу нервового імпульсу у паразита, що в подальшому призводить до його паралічу та загибелі. Імідаклоприд практично не впливає на ЦНС ссавців.

Моксидектин належить до другого покоління макроциклічних лактонів групи мільбеміцинів. Діюча речовина проявляє вплив проти багатьох енто- і ектопаразитів. Моксидектин взаємодіє з гама-аміно-масляною кислотою та з глутаровими хлорними каналцями паразитів. Внаслідок чого відбувається незворотне зниження м'язової активності, параліч та загибель паразитів.

Фармакокінетика

Після зовнішнього застосування імідаклоприд поширюється по всій поверхні тіла тварини впродовж однієї доби. Моксидектин абсорбується через шкіру і розповсюджується системно, досягаючи максимальної концентрації в плазмі крові через 1-2 доби. Моксидектин виводиться з організму повільно протягом 1 місяця.

Застосування

Лікування та профілактика котів при ураженні блохами (*Ctenocephalides felis*); лікування отодектозу (*Otodectes cynotis*) та нотоєдрозу (*Notoedres cati*); лікування кишечних (*Toxocara cati* і *Ancylostoma tubaeforme*) і легеневих (*Eucoleus aerophilus* / syn. *Capillaria aerophila*) нематодозів; профілактика дирофіляріозу (*Dirofilaria immitis*: мікродирофілярії L3 та L4 стадії).

Препарат може використовуватись як один із засобів при лікуванні алергічного блошиного дерматиту.

Показання до застосування котам	Лікування	Профілактика
Сифонаптерози: блохи <i>Ctenocephalides felis</i>	✓	✓
Акарози: отодектоз (<i>Otodectes cynotis</i>), нотоєдроз (<i>Notoedres cati</i>)	✓	
Аскаридатози: <i>Toxocara cati</i> (личинки L4 стадії, молоді та статевозрілі нематоди)	✓	
Стронгілятози: <i>Ancylostoma tubaeforme</i> (личинки L4 стадії, молоді та статевозрілі нематоди)	✓	
Трихуратози органів дихання: <i>Eucoleus aerophilus</i> / syn. <i>Capillaria aerophila</i> (статевозрілі)	✓	
Філяріатози: дирофілярії <i>Dirofilaria immitis</i> (мікродирофілярії L3 та L4 стадії)		✓

Лікування та профілактика тхорів при ураженні блохами (*Ctenocephalides felis*), а також профілактика дирофіляріозу (*Dirofilaria immitis*: мікродирофілярії L3 та L4 стадії).

Дозування

Мінімальна рекомендована доза імідаклоприду - 10 мг/кг маси тіла, моксидектину - 1,0 мг/кг маси тіла, що еквівалентно 0,1 мл Адвокату® для котів на 1 кг маси тіла тварини.

Схема дозування Адвокату® для котів та тхорів:

Маса тіла тварин (кг)	Розмір піпетки	Об'єм, (мл)	Імідаклоприд (мг/кг маси тіла)	Моксидектин (мг/кг маси тіла)
≤ 4 кг	Адвокат® для маленьких котів та тхорів	0,4	Мінімум 10	Мінімум 1
> 4 - 8 кг	Адвокат® для великих котів	0,8	10-20	1-2
> 8 кг	Відповідна комбінація піпеток			

Коти:

Лікування та профілактика сифонаптерозу (ураження блохами)

Одноразова обробка попереджає зараження блохами впродовж 4-х тижнів. Доцільно поєднувати обробку тварини препаратом Адвокат® для котів з обробкою місць перебування тварин з метою переривання життєвого циклу бліх. При лікуванні алергічного блошиного дерматиту препарат рекомендується застосовувати щомісяця.

Лікування отодектозу

Одноразове застосування. Можлива повторна обробка через 30 діб. Не наносити препарат безпосередньо у вушний канал.

Лікування нотоедрозу

Одноразове застосування.

Лікування та профілактика кишечних і легеневих нематодозів

Щомісячна обробка тварин препаратом знижує можливість зараження нематодами. Препарат також використовують у період профілактичного карантинування (за результатами дослідження проб калу), при планових та сезонних дегельмінтизаціях котів проти кишечних та легеневих нематодозів.

Профілактика дирофіляріозу

Препарат застосовують за 1 місяць до очікуваної активності кровосисних комах, впродовж усього періоду активності та ще місяць після завершення їхньої активності, або протягом усього року. Обробку тварин рекомендується проводити щомісяця в один і той же день. Якщо тварині застосовували інший препарат, який захищає від мікродирофілярій, Адвокат® для котів можна застосовувати через 1 місяць після обробки попереднім препаратом.

Тхорі:


Лікування та профілактика сифонаптерозу (ураження блохами)

Застосування препарату попереджає зараження блохами впродовж 3-х тижнів. При високій активності бліх у зовнішньому середовищі рекомендується повторна обробка через 2 тижні.

Профілактика дирофіляріозу

Препарат застосовують за місяць до очікуваної активності кровосисних комах, впродовж усього періоду активності та ще місяць після завершення їхньої активності, або впродовж усього року. Обробку тварин рекомендується проводити щомісяця в один і той же день.

Спосіб застосування



Препарат застосовують лише зовнішньо. Взяти одну піпетку з упакування. Тримавши піпетку у вертикальному положенні, відкрутити і зняти ковпачок. Далі перевернути ковпачок, одягнути його на піпетку, і відкрити видаливши фольгу.

У ділянці шиї біля основи черепа розділити шерсть тварини, щоб видно було шкіру. Розмістити кінець піпетки на шкіру, міцно стиснути піпетку декілька разів, нанести весь вміст безпосередньо на шкіру. Наносити препарат на непошкоджену шкіру.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам з гіперчутливістю до складників препарату.

Для котів: кошенятам віком до 9-ти тижнів; застосування препарату тваринам масою тіла до 1 кг повинно ґрунтуватися на оцінці ризику та необхідності лікування.

Для тхорів: не застосовувати препарат Адвокат® для котів фасуванням для великих котів (0,8 мл), або препарат Адвокат® для собак. Лікування тварин масою тіла до 0,8 кг повинно ґрунтуватися на оцінці ризику та необхідності лікування.

Не використовувати для лікування канарок.

Застереження

Часте застосування шампуню може зменшити ефективність препарату. Купання тварин 1-2 рази у період між щомісячними обробками тварин препаратом Адвокат® для котів не впливає на ефективність препарату.

Ефективність препарату Адвокат® для котів не тестувалась на тхорах масою тіла більше 2 кг, тому тривалість дії препарату може бути меншою у цих тварин.

Часте та повторне використання екто- і ендопаразитоцидів будь-якого класу може призвести до виникнення резистентності до діючої речовини. Використання препаратів має бути призначене після проведення оцінки доцільності призначення препарату.

Препарат не досліджувався на вагітних та лактуючих тваринах.

Лабораторні дослідження імідаклоприду та моксидектину на щурах та кроликах не дали тератогенних, фетотоксичних або матково-токсичних ефектів.

Використовувати тільки після призначення ветеринарним лікарем.

Лікування котів масою тіла до 1 кг та тхорів до 0,8 кг повинно базуватися на оцінці ризику вигоди.

Існує обмежений досвід використання продукту хворим та ослабленим тваринам, тому лікування повинно базуватися на оцінці ризику вигоди.

Не допускати потрапляння препарату в очі та до ротової порожнини тварин. Не дозволяти щойно обробленим тваринам облизувати одне одного.

Оскільки використання препарату тваринам, ураженим дорослими дирофіляріями, може призвести до серйозних побічних наслідків, включаючи загибель тварини, то перед застосуванням препарату необхідно провести діагностику котів та тхорів віком старше 6 місяців на дирофіляріоз (статевозрілі паразити). Якщо діагноз підтверджується, то тварин необхідно лікувати щодо дирофіляріозу згідно з листівкою вкладкою препарату (п. дозування).

Під час обробки тварин не можна палити, пити і приймати їжу.

Уникати попадання препарату на шкіру, в очі, у ротову порожнину. При випадковому попаданні препарату на шкіру, слизові оболонки або очі необхідно ретельно промити їх проточною

25.04.2018

водою. Якщо подразнення шкіри або очей не проходить, або препарат випадково був заковтнутий, необхідно звернутися до лікаря і показати листівку-вкладку або етикетку препарату.

Після роботи з препаратом необхідно ретельно вимити руки.

Люди із гіперчутливістю до складників препарату Адвокат® для котів повинні наносити препарат з обережністю.

Після застосування препарату у котів можливий короточасний свербіж, у рідких випадках спостерігають еритему, ознаки засалювання шерсті, блювоту. Ці прояви швидко минають без лікування.

У тварин, які випадково злизали препарат відразу після нанесення, можуть виникнути ознаки нервових розладів (атаксія, генералізований тремор, розширення зіниць, нистагми), порушення дихання, посилене слиновиділення та блювота. Ці ознаки зникають через декілька хвилин без додаткового лікування.

Продукт гіркий на смак, тому саливація, що виникає після злизування препарату, не є ознакою інтоксикації і зникає через декілька хвилин без лікування. Правильне нанесення препарату мінімізує можливість злизування препарату.

В дуже рідких випадках застосування препарату може стати причиною тимчасових змін у поведінці тварини, таких як млявість, збудження та відсутність апетиту.

Після застосування препарату не можна стригти тварин до повного висихання препарату на шкірі. Розчинник, що входить до складу Адвокату® для котів, може залишати плями та псувати такі матеріали як шкіра, тканини, пластик та інші. Якщо тварини утримуються у квартирі і мають доступ до меблів, то після обробки їх необхідно утримувати окремо до повного висихання препарату на шкірі.

Не допускати щойно оброблених тварин облизувати себе та одне одного.

Форма випуску

Піпетки по 0,4 та 0,8 мл запаковані в блістери по 3, 4, 6, 21 або 42 штуки. Пакувальний матеріал: білі поліпропіленові труби з ковпачками.

Зберігання

Зберігати препарат у закритому упакуванні виробника в сухому недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 0 до 30 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

Байер Енімал Хелс ГмбХ,
D-51368, Леверкузен, Німеччина

Bayer Animal Health GmbH
D-51368, Leverkusen, Germany

Виробник продукту:

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ,
Проенсдорфер стр. 324, D-24106 Кіль,
Німеччина


KVP Pharma+Veterinar Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324,
D-24106 Kiel
Germany

Додаток 3
до реєстраційного посвідчення АА-04159-01-13
25.04.2018



Advocate
котячий для зовнішнього застосування
ліки для борючого застосування

3 x
0,8 МЛ
4-8 КГ




Advocate

- Адвокат® для котів**
масою тіла від 4 до 8 кг
Адвокат® для котів
масою тіла від 4 до 8 кг
- Flea Fleas
 - Lice Lice
 - Roundworm Roundworm
 - Heartworm Heartworm
 - Ticks Ticks
 - Ear mites Ear mites
 - Demodex Demodex
 - Scabies Scabies
 - Ringworm Ringworm
 - Microscopic mites Microscopic mites

Одна пілетка містить 80 мг
імдаклоприду та 8 мг моксидектину
Одна пілетка містить 80 мг
імдаклоприду та 8 мг моксидектину

3 x 0,8 МЛ



advocate

Адвокат® для котів масою тіла від 4 до 8 кг
Адвокат® для котів масою тіла від 4 до 8 кг

0,8 МЛ



84792705

Advocate

Адвокат® для котів
масою тіла від 4 до 8 кг
Пілетка містить 3 пілетки по 0,8 мл

Показання:
Лікування та профілактика котів при паразитозах: блохи (Ctenocephalides felis), кліщів (Ixodes ricinus), вухакових кліщів (Otodectes cynotis), личинок і личинок (Toxocara cati / Alouicoma alata), стрижнів (Cylindrocephalus fortileg) і личинок (Eosinophilus albertii) і личинок (Eosinophilus albertii) і личинок (Eosinophilus albertii) і личинок (Eosinophilus albertii).

Препарат може застосовуватись як одно- чи двоетапно лікування алергічного бронхіту, способу застосування та зберігання.

Зберігання:
Хранити препарат у закритій, укладаній в непрозорий контейнер, недоступній для дітей та тварин місці, охолодіть до 0 до 30°C.

Продукт ГМХ, Девелопер.
Продукт ГМХ, Девелопер.

Власник реєстраційного посвідчення:
D-51368 Лейпциг, Німеччина

Продукт ГМХ, Девелопер.
Продукт ГМХ, Девелопер.

Продукт ГМХ, Девелопер.
Продукт ГМХ, Девелопер.

Bayer

Серія/Серия
Дата виготовлення/Дата изготовления
Примітки до огляду



Додаток 3
До реєстраційного посвідчення АА-04159-01-13
25.04.2018

Advocate® для котів

Масою тіла від 4 до 8 кг

Масою тіла до 4 кг

Упаковка містить 3 ліплетки по 0,4 мл

Показання:

Лікування та профілактика котів при лінійній лихоманці (Feline Infectious Anemia), нуклеокариї (Feline Nucleocytocidal Virus Infection), муріновій лейкозах (Feline Leukemia Virus Infection), муріновій коронарній вірусній енцефаліти (Feline Coronavirus Encephalitis), муріновій коронарній вірусній гастроентериті (Feline Coronavirus Gastroenteritis), муріновій коронарній вірусній пневмонії (Feline Coronavirus Pneumonia), муріновій коронарній вірусній нефриті (Feline Coronavirus Nephritis), муріновій коронарній вірусній нефропатії (Feline Coronavirus Nephropathy), муріновій коронарній вірусній нефрозі (Feline Coronavirus Nephrosis), муріновій коронарній вірусній нефрозахі (Feline Coronavirus Nephroses), муріновій коронарній вірусній нефроцистиці (Feline Coronavirus Nephrocystitis), муріновій коронарній вірусній нефроцистиці (Feline Coronavirus Nephrocystitis), муріновій коронарній вірусній нефроцистиці (Feline Coronavirus Nephrocystitis).

Препарат може використовуватися як одно- або двоетапний засіб при лікуванні вірусного блізного дерматиту, ураженнях шкіри при ураженні шкіри, а також профілактику аеробіозу (Dirofilimosis) і мікрофілірії (L3 та L4 стадії).

Дозування: спосіб застосування та прогнотозування: Дія ліплетки всмоктати. Звертати увагу на замітку про наявність виробника в ступню надруковану для дріт та лівани. Міся, вмісто від харчових продуктів та кормів, за температури від 0 до 37°C.

РП в Україні

Власник реєстраційного посвідчення: Байер Фарма Україна ТОВ, Львівська вулиця, 138, Львів, Україна

Виробник готового продукту: КВР Фарма, Ветеринарний завод, Львівська вулиця, 138, Львів, Україна

Продукт ГНХ, Промисловий стр. 324, Д-24106 Кієв, Україна

Advocate® для котів

Масою тіла до 4 кг

Упаковка містить 3 ліплетки по 0,4 мл

Лікування та профілактика котів при лінійній лихоманці (Feline Infectious Anemia), нуклеокариї (Feline Nucleocytocidal Virus Infection), муріновій лейкозах (Feline Leukemia Virus Infection), муріновій коронарній вірусній енцефаліти (Feline Coronavirus Encephalitis), муріновій коронарній вірусній гастроентериті (Feline Coronavirus Gastroenteritis), муріновій коронарній вірусній пневмонії (Feline Coronavirus Pneumonia), муріновій коронарній вірусній нефриті (Feline Coronavirus Nephritis), муріновій коронарній вірусній нефропатії (Feline Coronavirus Nephropathy), муріновій коронарній вірусній нефрозі (Feline Coronavirus Nephrosis), муріновій коронарній вірусній нефрозахі (Feline Coronavirus Nephroses), муріновій коронарній вірусній нефроцистиці (Feline Coronavirus Nephrocystitis), муріновій коронарній вірусній нефроцистиці (Feline Coronavirus Nephrocystitis), муріновій коронарній вірусній нефроцистиці (Feline Coronavirus Nephrocystitis).

Препарат може використовуватися як одно- або двоетапний засіб при лікуванні вірусного блізного дерматиту, ураженнях шкіри при ураженні шкіри, а також профілактику аеробіозу (Dirofilimosis) і мікрофілірії (L3 та L4 стадії).

Дозування: спосіб застосування та прогнотозування: Сп. ліплетку всмоктати. Харчування: покласти препарат в закриту упаковку дитям і жовтими місцями, одразу після лікування продуктів та кормів, при температурі від 0 до 37°C.

Власник реєстраційного посвідчення: Байер Фарма Україна ТОВ, Львівська вулиця, 138, Львів, Україна

Виробник готового продукту: КВР Фарма, Ветеринарний завод, Львівська вулиця, 138, Львів, Україна


Продукт ГНХ, Промисловий стр. 324, Д-24106 Кієв, Україна

Байер

Серія/Серии

Дата виготовлення/Дата изготовления

Продати до/До продажи



Advocate® для котів

МАСОЮ ТІЛА ВІД 4 ДО 8 КГ
МАСОЮ ТІЛА ОТ 4 ДО 8 КГ

для котів/ для котів

для хорьків/ для хорьков

Одна ліплетка містить 40 мг імідаксприду та 4 мг моксидектину
Одна ліплетка містить 40 мг імідаксприду та 4 мг моксидектину

3 x 0,4 МЛ

advocate®

Адвокат® для котів масою тіла до 4 кг та тхорів
Адвокат® для нотов масою тіла до 4 кг и хорьков



0,4 МЛ

84792667

