

Вектра 3D (Vektra 3D) краплі від бліх та кліщів інсектоакарицидні для собак вагою від 25 до 40 кг, 1 піпетка 4,7 мл.

Прозорий розчин блідо-жовтого кольору.

Склад:

1 мл препарату містить діючі речовини:

динотефуран – 54 мг,

перметрин – 397 мг,

пірипроксифен – 4,48 мг.

Допоміжні речовини: N-октил-2-піролідон, N-метил піролідон.

Фармакологічні властивості:

ATCvet QP53, ектопаразитициди, інсектициди та репеленти (ATCvet QP53AC04, перметрин).

Перметрин, що входить до складу препарату Вектра® 3D, є синтетичним піретроїдом, механізм дії якого полягає у блокуванні проведення нервового імпульсу в організмі ектопаразиту за рахунок зниження проникності мембран для іонів натрію, що призводить до незворотного паралічу та загибелі.

Динотефуран – похідне гуанідину, відноситься до нейротоксинів класу неонікотиноїдів, діє на постсинаптичні ацетилхолінові рецептори нервової системи, викликаючи загибель ектопаразитів.

Пірипроксифен - аналог ювенільного гормону, що регулює зростання та розвиток комах, у тому числі і бліх. Механізм його дії полягає у порушенні нормального циклу метаморфозу комах.

При нашкірному нанесенні речовини, що входять до складу препарату, кумулюються в епідермісі, волосяних фолікулах і сальних залозах, що сприяє тривалій контактній інсектоакарицидній та репелентній дії.

Застосування:

Лікування собак при ураженні бліхами (*Siphonaptera* spp.), вошами (*Sipunculata* spp.) та волосоїдами (*Trichodectides* spp.). Інсектицидна ефективність триває протягом 1 місяця, овоцидна та ларвіцидна – 2 місяці. Також препарат рекомендується застосовувати у комплексній терапії алергічного дерматиту, спричиненого укусами бліх.

Лікування собак при ураженні кліщами *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus*. Репелентна та акарицидна ефективність проти *Rhipicephalus sanguineus* та *Ixodes ricinus* триває 1 місяць проти *Dermacentor reticulatus* до 3-х тижнів.

Лікування собак при ураженні мухами-жигалками, комарами, мошками та москітами (*Stomoxys calcitrans*, *Aedes aegypti*, *Culex pipiens*, *Simulium galeratum*, *Phlebotomus perniciosus*). Інсектицидна та репелентна ефективність триває 1 місяць.

Дозування:

Препарат застосовують шляхом топікального (краплинного) нанесення на суху неушкоджену шкіру у недоступному для злизування тваринному місці (між лопатками). Мінімальна рекомендована доза становить 6,4 мг динотефурану/кг маси тіла тварини, 0,6 мг пірипроксифену/кг маси тіла тварини та 46,6 мг перметрину/кг маси тіла тварини, що еквівалентно 0,12 мг препарату/кг маси тіла тварини. Препарат наносять на шкіру в кількох місцях у дозах:

Маса тіла тварини, кг	Колір кришечки аплікатора	Об'єм піпетки, см ³ (мл)	Кількість піпеток, шт	Кількість нанесень
1,5 – 4,0	Жовтий	0,8	1	1
4,1 – 10,0	Бірюзовий	1,6	1	2
10,1 – 25,0	Блакитний	3,6	1	3
25,1 – 40,0	Фіолетовий	4,7	1	3
40,1 - 65,0	червоний	8,0	1	4

Повторну обробку протягом сезону активності ектопаразитів слід проводити за показаннями, але не частіше ніж один раз на 30 діб.

Протипоказання:

Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до компонентів препарату!

Не застосовувати препарат цуценятам віком до 7 тижнів, собакам масою тіла до 1,5 кг, старим, хворим та ослабленим тваринам!

Категорично забороняється застосовувати препарат кішкам, оскільки він містить у своєму складі перметрин!

Застереження:

Уникати потрапляння препарату на слизові оболонки. Не наносити препарат на вологу чи пошкоджену шкіру. Не купати тварин 48 годин після застосування препарату. Якщо в будинку міститься кілька собак, їх необхідно обробляти всіх одночасно. Для профілактики повторного ураження тварин блохами, необхідно регулярно обробляти відповідними засобами житла.

Препарат є токсичним для кішок завдяки перметрину, що входить до його складу. При випадковому попаданні препарату на шерсть або шкіру kota його необхідно відразу змити водою з шампунем або милом. У разі утримання кішок і собак в одному приміщенні собак оброблених препаратом містять окремо до повного висихання препарату.

Ефективність препарату залишається високою навіть при частому купанні чи плаванні тварин.

Форма випуску: Піпетки з алюмінієво-полімерного матеріалу 0,8; 1,6; 3,6; 4,7 та 8 мл. Піпетки пакують у картонні коробки по 1, 3, 4, 6, 12, 24 або 48 шт.

Зберігання: Сухе темне, недоступне для дітей, місце при температурі від 0 до +25°C.

Термін придатності: 3 роки.

Виробник: Сева, Франція.