

Опис

Прозорий розчин блідо-жовтого кольору.

Склад

0,9 мл препарату містять діючі речовини:

динотефуран - 423 мг,

пірипроксифен - 42,3 мг.

Допоміжні речовини: диметилсульфоксид.

Фармакологічні властивості

АТСvet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти

Динотефуран – похідний гуанідину, належить до нейротоксинів класу неонікотиноїдів, діє на постсинаптичні ацетилхолінові рецептори нервової системи, спричиняючи загибель ектопаразитів.

Пірипроксифен – аналог ювенільного гормону, що регулює ріст і розвиток комах, у тому числі і бліх. Механізм його дії полягає в порушенні нормального циклу метаморфози комах: яйце - личинка - лялечка - імаго.

При нашкірному нанесенні, речовини, що входять до складу препарату, кумулюються в епідермісі, волосяних фолікулах і жирових залозах, що сприяє довготривалій контактній інсектоакарицидній і репелентній дії.

Застосування

Лікування котів при ураженні блохами (*Ctenocephalides felis*) на усіх фазах розвитку комах (яйце-личинка-лялечка-доросла комаха).

Препарат Вектра Феліс може застосовуватися у комплексній програмі лікування і профілактики алергічного дерматиту (FAD).

Дозування

Препарат Вектра Феліс застосовують зовнішньо шляхом точкового нанесення на суху неушкоджену шкіру в недоступному для злизування тваринам місці (між лопатками).

Одна піпетка розрахована для застосування одній тварині відповідно до рекомендованої мінімальної дози – 42,3 мг динотефурану/кг маси тіла тварини та 4,23 мг пірипроксифену/кг маси тіла тварини.

Спосіб застосування:

1. Виймають піпетку з упаковки.
2. Тримавши кришечкою догори, утримують піпетку пальцями нижче більшого диску.
3. Другою рукою натискають вниз на менший диск до притискання обох дисків. Таким чином проколюється захисна мембрана.
4. Розгортають шерсть тварини так, щоб видно було шкіру і наносять препарат, обережно стискаючи стінки піпетки. Тварина повинна знаходитись у зручному положенні для нанесення препарату. Уникати потрапляння препарату на шерсть тварини.

Одноразова обробка тварини препаратом Вектра Феліс попереджає ураження блохами щонайменше впродовж одного місяця. Повторну обробку рекомендують проводити через 30 діб. При сильному ураженні блохами за рекомендацією лікаря ветеринарної медицини обробку можна повторити через 2 тижні.

Протипоказання

Не застосовують препарат Вектра Феліс кошенятам віком до 7 тижнів і масою тіла до 0,6 кг, при індивідуальній гіперчутливості до компонентів препарату. З ОБЕРЕЖНІСТЮ застосовують ослабленим, хворим і вагітним тваринам після консультації з лікарем ветеринарної медицини.

Застереження

Уникати попадання препарату в очі та на слизові оболонки. Не наносити препарат на вологу або ушкоджену шкіру. Не рекомендують купати тварин впродовж 48 годин після обробки препаратом.

Якщо у приміщенні утримують декількох котів, то їх необхідно обробляти препаратом одночасно.

Для профілактики ураження тварин блохами необхідно утримувати місця перебування тварин у чистоті і періодично (через кожні два тижні в теплу пору року) обробляти їх інсектицидними препаратами (напр. Неостомазаном).

Форма випуску

Полімерні піпетки по 0,9 мл заповнені у картонні коробки по 1, 3, 6, 12 або 72 шт.

Зберігання

Сухе темне недоступне для дітей місце за температури від 0 до 25 °С.

Термін придатності

3 роки.