

Boehringer Ingelheim Фронтлайн Комбо - інсекто-акарицидний розчин контактної дії для зовнішнього застосування для собак вагою від 2 до 10 кг.

Призначення:

Профілактика та лікування собак при ураженнях блохами (*Ctenocephalides spp.*), кліщами (*Ixodes ricinus*, *Dermatocentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*), та волосоїдами (*Trichodectes canis*).

Препарат можуть застосовувати, як один із засобів, при лікуванні блошиного алергічного дерматиту собак.

Механізм дії:

Фіпроніл, який входить до складу препарату, похідний фенілпіразолу з інсектицидною і акарицидною дією. Механізм дії фіпронілу полягає в блокуванні ГАМК-залежних рецепторів паразитів, порушенні передачі нервових імпульсів, що призводить до ураження нервової системи ектопаразитів і їх загибелі. Фіпроніл не впливає на центральну нервову систему теплокровних тварин.

S-метопрен імітує дію ювенільного гормону і викликає порушення розвитку та смерть бліх на стадіях яйця і личинки. S-метопрен проникає в оболонку щойно відкладених яєць, а також у личинки та лялечки і блокує їх розвиток, запобігаючи появі статевозрілих комах.

Після нанесення препарату на шкіру активні компоненти поступово розподіляються по всій поверхні тіла тварини, кумулюються в епідермісі, волосяних цибулинах і сальних залозах, та поступово вивільняючись забезпечують тривалий захист тварини від ектопаразитів. Після обробки собак препаратом, блохи (*Ctenocephalides spp.*) гинуть протягом 24 годин; кліщі (*Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes scapularis*, *Ixodes ricinus*, *Haemaphysalis longicornis*, *Haemaphysalis flava*, *Haemaphysalis campanulata*) та волосоїди (*Trichodectes canis*) протягом 48 годин.

Чому варто придбати?

- o Має виражену протидію відносно вошей, бліх, волосоїдів (на всіх стадіях розвитку, від личинки до дорослого паразита);
- o Використовується в складі комплексної терапії для лікування блошиного дерматиту;
- o При нанесенні на шкіру препарат не всмоктується відразу, а поступово, протягом 24 годин. Розподіляється по поверхні тіла і резервується в сальних залозах, надаючи тривалу протипаразитарну дію;
- o Знищує не тільки дорослих бліх, а і на стадіях яйця і личинки;
- o Забезпечує захист від кліщів до 4 тижнів, від бліх та вошей до 8 тижнів;
- o Малотоксичний для собак.

Як використовувати

- o Препарат застосовують зовнішньо шляхом одноразового нанесення на суху непошкоджену шкіру, відповідно до мінімальної рекомендованої дози, яка залежить від маси тіла тварини.
- o Мінімальна рекомендована доза: фіпроніл – 6,7 мг/кг; (S)-метопрен – 6 мг/кг.
- o Перед обробкою взяти піпетку вертикально кінчиком догори, натиснути на нього таким чином, щоб вміст залишався в основному корпусі, відламати кінчик, розділити шерсть тварини та видавити вміст піпетки безпосередньо на шкіру тварини у ділянку ший перед лопатками.
- o Обробку тварин проти бліх та кліщів рекомендується проводити 1 раз на 4 тижні.
- o Одна обробка забезпечує захист собак від бліх та вошей на 8 тижнів, від кліщів – до 4 тижнів.

Протипоказання

Не застосовувати цуценятам віком до 8 тижнів та/або масою тіла до 2 кг.

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам!

Не застосовувати для котів, оскільки це може призвести до передозування.

Використання під час вагітності, лактації

Застережень немає.