

Boehringer Ingelheim Фронтлайн спот он - інсекто-акарицидний розчин контактної дії для зовнішнього застосування для котів та кошенят з 8 тижневого віку та вагою від 1 кг.

Призначення:

Профілактика та лікування котів при ураженні ектопаразитами: паразитиформними кліщами (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor* spp., *Rhipicephalus* spp.), блохами (*Ctenocephalides* spp., *Pulex irritans*), волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), вошами (*Linognathus setosus*).

Механізм дії:

Фіпроніл, який входить до складу препарату, похідний піразолу з інсектицидною і акарицидною дією. Механізм дії фіпронілу полягає в блокуванні ГАМК-залежних рецепторів паразитів, порушенні передачі нервових імпульсів, що призводить до ураження нервової системи ектопаразитів і їх загибелі. Фіпроніл не впливає на центральну нервову систему ссавців.

Після нанесення препарату на шкіру фіпроніл, кумулюючись у волосяних цибулинах і жирових залозах, поступово виділяється чим забезпечує тривалий захист тварин від ектопаразитів.

Як використовувати

о Препарат застосовують котам шляхом однократного нанесення на суху непошкоджену шкіру, відповідно до мінімальної рекомендованої дози, яка залежить від маси тіла тварини.

о Одна піпетка розрахована на одну обробку тварини.

о Перед обробкою взяти піпетку вертикально, зламати кінчик піпетки, розділити шерсть тварини і видавити вміст піпетки безпосередньо на шкіру тварини в одне місце: основа шиї в передній частині лопаток або між лопатками.

о Обробку тварин проти бліх та кліщів рекомендується проводити 1 раз на 4 тижні.

о Одна обробка забезпечує захист котів від бліх – до 5 тижнів, від кліщів – до 3-4 тижнів.

Протипоказання

Не застосовувати кошенятам віком до 8 тижнів та котам масою тіла до 1 кг.

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам!

Не застосовувати для кролів.

Не застосовувати тваринам при гіперчутливості до компонентів препарату.

Використання під час вагітності, лактації

Застережень немає.