

Boehringer Ingelheim Фронтлайн спот он - інсекто-акарицидний розчин контактної дії для зовнішнього застосування для цуценят та собак з 8 тижневого віку та вагою від 2 до 10 кг.

Призначення:

Профілактика та лікування котів при ураженні ектопаразитами: паразитиформними кліщами (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor* spp., *Rhipicephalus* spp.), блохами (*Ctenocephalides* spp., *Pulex irritans*), волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*), вошами (*Linognathus setosus*).

Механізм дії:

Фіпроніл, який входить до складу препарату, похідний піразолу з інсектицидною і акарицидною дією. Механізм дії фіпронілу полягає в блокуванні ГАМК-залежних рецепторів паразитів, порушенні передачі нервових імпульсів, що призводить до ураження нервової системи ектопаразитів і їх загибелі. Фіпроніл не впливає на центральну нервову систему ссавців.

Після нанесення препарату на шкіру фіпроніл, кумулюючись у волосяних цибулинах і жирових залозах, поступово виділяється чим забезпечує тривалий захист тварин від ектопаразитів.

Як використовувати

- o Препарат застосовують собакам шляхом однократного нанесення на суху непошкоджену шкіру, відповідно до мінімальної рекомендованої дози, яка залежить від маси тіла тварини.
- o При обробці собак масою тіла більше 60 кг використовують комбінацію піпеток різного об'єму.
- o Одна піпетка розрахована на одну обробку тварини.
- o Перед обробкою взяти піпетку вертикально, зламати кінчик піпетки, розділити шерсть тварини і видавити вміст піпетки безпосередньо на шкіру тварини в одне місце: основа шиї в передній частині лопаток або між лопатками.
- o Обробку тварин проти бліх та кліщів рекомендується проводити 1 раз на 4 тижні.
- o Одна обробка забезпечує захист собак від бліх – до 5 тижнів, від кліщів – до 3-4 тижнів.

Протипоказання

- Не застосовувати цуценятам віком до 8 тижнів та собакам масою тіла до 2 кг.
- Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам!
- Не застосовувати для кролів.
- Не застосовувати тваринам при гіперчутливості до компонентів препарату.

Використання під час вагітності, лактації

Застережень немає.