

МЕГАСТОП УЛЬТРА для котів
(роздріб для зовнішнього застосування, точкового нанесення)
 листівка—кладка

Опис

Прозорий розчин від слабко-жовтого до жовтого кольору без механічних включення.

Склад

1 ml (мл) містить діючі речовини:
 імідаклоприд – 100 mg (мг);
 моксідектин – 10 mg (мг).

Допоміжні речовини: пропіленкарбонат, диметилсульфоксид, кислота лимонна, полістиленгліколь-400.

Для котів з різною масою тіла – відповідні піпетки різних об'ємів препарату МЕГАСТОП УЛЬТРА для котів:

Маса тіла тварин kg (кг)	Об'єм, ml (мл)	Імідаклоприд, mg (мг)	Моксідектин, mg (мг)
для котів масою тіла до 4 kg (кг) та хкорів	0,4	40	4
для котів масою тіла від 4 до 8 kg (кг)	0,8	80	8

Фармакологічні властивості

ATC vet: QP54AB52, моксідектин, комбінація (QP54AB02 – моксідектин, QP53AX17 – імідаклоприд).

МЕГАСТОП УЛЬТРА для котів – екто- і ендопаразитицид місцевого застосування. Фармакологічні властивості препарату зумовлені властивостями діючих речовин.

Фармакодинаміка

Імідаклоприд, діюча речовина препарату, належить до групи хлорнікотінілових сполук. Блокує постсинаптичні холінергічні рецептори, які чутливі до никотину і розміщені у ектопаразитів у центральній нервовій системі. Переривання передачі нервового імпульсу призводить до паралічу та загибелі паразитів.

Моксідектин належить до другого покоління макроциклических лангонів групи мільбеміцинів. Це паразитицид, який діє проти багатьох енд- та ектопаразитів. Взаємодіє з гама-аміномаслиновою кислотою та з глутаровими хлорними канальцями паразитів. Це призводить до відкриття хлорних каналів у постсинаптичному просторі. Збільшення кількості іонів хлору призводить до незворотного зниження м'язової активності, паралічу та загибелі паразита. Моксідектин активний проти личинок *Dirofilaria immitis*. Також він активний проти гастроінтестинальних нематод.

Фармакокінетика

Імідаклоприд має низький рівень проникнення через гематоенцефалічний бар'єр, тому практично не впливає на ЦНС ссавців.

Моксідектин абсорбується через шкіру і поширюється системно, досягаючи максимальної концентрації в плазмі крові через 1-2 доби. Моксідектин виводиться з організму повільно протягом 1 місяця.

Застосування

Профілактика та лікування котів при ураженні блохами (*Ctenocephalides felis*), саркоптиформними кліщами (*Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*), тромбіліформними кліщами (*Demodex* spp.), при книшкових (*Toxocara cati*, *Ancylostoma tubaeforme*) і легеневих (*Euceleus aerophilus* / syn. *Capillaria aerophila*) нематодозах; профілактика дірофіліяріозу (знищує мікродірофіларії L3 та L4 *Dirofilaria immitis*).

Препарат може використовуватись як один із засобів при лікуванні алергічного блошиного дерматиту.

Профілактика та лікування хкорів при ураженні блохами (*Ctenocephalides felis*); профілактика дірофіліяріозу (знищує мікродірофіларії L3 та L4 *Dirofilaria immitis*).

Дозування

Для котів різної маси тіла використовують піпетки МЕГАСТОП УЛЬТРА для котів відповідного об'єму:

Маса тіла тварин kg (кг)	Об'єм, ml (мл)	Імідаклоприд (mg (мг)/kg (кг) маси тіла тварини)	Моксідектин (mg (мг)/kg (кг) маси тіла тварини)
для котів масою тіла до 4 kg (кг) та хкорів	0,4	мінімальна доза 10	мінімальна доза 1
для котів масою тіла від 4 до 8 kg (кг)	0,8	10-20	1-2
для котів понад 8 kg (кг)		відповідна комбінація піпеток	

Лікування та профілактика у котів та хкорів при ураженні блохами

Одноразова обробка препаратом попереджує зараження блохами котів протягом 4 тижнів та хкорів протягом 3 тижнів. Личинки бліх можуть з'являтися в наїволосиному середовищі, тому необхідно додатково обробляти місця перебування тварин та предмети догляду з метою переривання життевого циклу бліх.

При лікуванні алергічного блошиного дерматиту препарат рекомендується застосовувати щомісяця.

Лікування отодектозу у котів

Одноразова обробка препаратом. За рекомендацією ветеринарного лікаря можлива повторна обробка через 30 діб. Не наносити безпосередньо у вушний канал.

Лікування потоєдрозу у комів

Одноразова обробка препаратом. За необхідності курс лікування повторюють під контролем мікроскопії зіскрібків шкіри.

Лікування демодекозу у комів

Препарат застосовують 2-4 рази з інтервалом 30 діб. У тяжких випадках препарат застосовують з інтервалом 7 діб. За необхідності курс лікування повторюють під контролем мікроскопії зіскрібків шкіри. Лікування рекомендується проводити комплексно із застосуванням стіотропних, патогенетичних і симптоматичних засобів.

Лікування та профілактика кникових і лесеневих нематодозів у комів

З лікуванальною метою препарат застосовують одноразово, за необхідності (за результатами лабораторних досліджень) через 14 діб обробку потрібно повторити. З профілактичною метою препарат застосовують один раз на місяць.

Профілактика дірофіляріозу у комів та хорів

Препарат застосовують за місяць до очікуваної активності кровосисних комах, протягом усього періоду активності та ще місяць після завершення їхньої активності, або протягом всього року. Обробку тварин рекомендується проводити щомісяця в один і той самий день.

Порядок застосування

Препарат застосовувати лише зовнішньо. На ділянці шій біля основи черепа розділити шерсть тварини, щоб видно було шкіру. Розмістити кінець піпетки на шкірі, міцно стиснути піпетку декілька разів, нанести весь вміст безпосередньо на шкіру. Наносити препарат на непошкоджену поверхню шкіри.

Протипоказання

Не застосовувати кощенятам віком до 9 тижнів!

Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до складників препарату!

Не застосовувати тхорам препарат МЕГАСТОП УЛЬТРА для котів масою тіла від 4 до 8 kg (кг) фурмою випуску 0,8 ml (мл) та препарат МЕГАСТОП УЛЬТРА для собак!

Лікування хворих та ослаблених тварин, а також котів з масою тіла до 1 kg (кг) і хорів з масою тіла до 0,8 kg (кг) повинно ґрунтуватися на оцінці ризику та необхідності лікування лікарем ветеринарної медицини!

Використання препарату під час вагітності та лактації ґрунтуються на оцінці ризику і необхідності лікування лікарем ветеринарної медицини!

Застереження

Препарат наносити лише на неушкоджену поверхню шкіри.

При обробці тварин уникати попадання препарату в очі, ротову порожнину. Не допускати контакту щойно обробленої тварини з іншими тваринами.

Використання препарату під час вагітності та лактації ґрунтуються на оцінці ризику та необхідності лікування лікарем ветеринарної медицини.

При роботі з препаратом дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Часте використання шампуню після обробки тварин зменшує ефективність препарату.

При виникненні ознак побічної дії препарат змінти водою з шампунем і за порадою лікаря ветеринарної медицини застосовувати альтернативний ветеринарний лікарський засіб.

Не застосовувати одночасно з іншими протипаразитарними макроциклічними лактонами.

Форма випуску

Полімерні піпетки по:

0,4 ml (мл) – для котів з масою тіла до 4 kg (кг) та хорів;

0,8 ml (мл) - для котів з масою тіла від 4 до 8 kg (кг).

Полімерні піпетки упаковані у картонні коробки по 1 та 4 шт.

Зберігання

Зберігати препарат у сухому недоступному для дітей та тварин місці, окрім від харчових продуктів та кормів за температури від 0 °C до 30 °C.

Термін придатності

3 роки.

Лише для ветеринарної медицини!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»,
вул. Полтавський Шлях, 115, м. Харків, 61093, Україна.

+38(057) 766-36-36

Виробник готового продукту

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

вул. Зернова, 4, м. Харків, 61105, Україна.

info@provet.ua

provet.ua