

**ПРАЗІСТОП УЛЬТРА для собак
(таблетки)**

листівка-вкладка

Опис

Таблетки у формі кісточки, жовтого кольору з можливими коричневими крапляннями зі специфічним запахом

Склад

Одна таблетка (900 mg (мг)) містить діючі речовини:

фебантел - 150,0 mg (мг);

пірантелу памоат - 144,0 mg (мг);

празіквантел - 50,0 mg (мг).

Допоміжні речовини: лактози моногідрат, мікрокристалічна целюлоза, крохмаль кукурудзяний, повідон К-30, натрію кроскармелоза, натрію хлорид, кальцію стеарат, ароматизатор «м'ясо»

Фармакологічні властивості

АТС vet QP52 антигельмінтні ветеринарні препарати (QP52AA51, празіквантел, комбінації)

ПРАЗІСТОП УЛЬТРА – антигельмінтний ветеринарний препарат комбінованої дії проти круглих, стьожкових гельмінтів та найпростіших (*Giardia* spp.), який містить діючі речовини: фебантел, пірантелу памоат, празіквантел.

Комбінація діючих речовин *пірантелу памоату* та *фебантелу*, що входять до складу препарату, мають синергічну дію проти нематод (аскарид, унцинарій волосоголовців) та найпростіших *Giardia* у собак. Зокрема спектр дії: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria Stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis* та *Giardia* spp.

Празіквантел активний проти цестод у собак: *Taenia species*, *Dipilidium caninum*, *Echinococcus granulosus* та *Echinococcus multilocularis*. Празіквантел діє проти всіх кишкових личинкових стадій цих паразитів. Також празіквантел активний проти деяких видів збудників протозойних захворювань (*Giardia* spp.).

Пірантел діє як холінергічний антагоніст, викликаючи спастичний параліч круглих гельмінтів шляхом деполаризуючої нервово-м'язової блокади.

Антигельмінтна ефективність *фебантелу* зумовлена його здатністю гальмувати процес полімеризації тубуліну в мікроканальцях. У результаті структурних та функціональних метаболічних розладів виснажуються енергетичні запаси паразитів, внаслідок чого настає їхня загибель на 2-3 добу.

Празіквантел швидко всмоктується через зовнішню оболонку стьожкових гельмінтів, внаслідок чого настає її пошкодження та скорочення. Це призводить до руйнування зовнішньої оболонки, розладів метаболізму і загибелі паразита.

Застосування

Профілактика та лікування цуценят та дорослих собак при ураженні круглими та стьожковими гельмінтами:

круглі гельмінти: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (дорослі та личинки), *Uncinaria Stenocephala* (дорослі), *Ancylostoma caninum* (дорослі), *Trichuris vulpis* (дорослі);

стьожкові гельмінти (дорослі та личинки): *Echinococcus granulosus*, *E. multilocularis*, *Dipilidium caninum*, *Taenia* spp., *Mesocestoides* spp.

Лікування протозойних захворювань цуценят та дорослих собак, викликаних лямбліями (*Giardia* spp.).

Дозування

Рекомендована доза - 1 таблетка на 10 kg (кг) маси тіла тварини (фебантелу - 15 mg (мг), пірантелу памоату - 14,4 mg (мг) та празіквантелу - 5 mg (мг) на 1 kg (кг) маси тіла тварини).

Дози препарату ПРАЗІСТОП УЛЬТРА для собак середніх та великих порід, залежно від маси тіла:

Маса тіла тварини, kg (кг)	Кількість таблеток, шт.
від 1 до 5	1/2
від 5,1 до 10	1
від 10,1 до 15	1,5
від 15,1 до 20	2

Застосовують перорально, з кормом або примусово на корінь язика. Без дотримання діти. Рекомендують застосовувати перед годівлею.

Тривалість лікування: одноразово. При необхідності повторити через 2 тижні.

Дегельмінтизацію рекомендують проводити 1 раз на квартал.

Не застосовувати собакам масою тіла до 1 kg (кг).

Лікування при лямбліозі (*Giardia* spp.): рекомендована доза - 1 таблетка на 10 kg (кг) маси тіла тварини (фебантелу - 15 mg (mg), пірантелу памоату - 14,4 mg (mg) та празіквантелу - 5 mg (mg) на 1 kg (кг) маси тіла тварини), застосовують впродовж 3 днів.

Для запобігання повторних інвазій необхідно утримувати у чистоті місця перебування тварин.

Протипоказання

Не застосовувати одночасно з піперазином і препаратами, які інгібують холінестеразу!

Не застосовувати тваринам з гіперчутливістю до складників препарату!

Не застосовувати собакам масою тіла до 1 kg (кг)!

Не застосовувати виснаженим та хворим на інфекційні захворювання тваринам!

Не застосовувати тваринам із захворюваннями печінки!

Не застосовувати самкам у перші дві третини періоду вагітності!

Застереження

Дотримуватися рекомендованого дозування.

Людина, яка працює з препаратом, повинна дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, що прийняті при роботі з ветеринарними препаратами.

Форма випуску

Блістери по 2 та 10 таблеток, запаковані у картонні коробки.

Зберігання

Зберігати препарат у сухому темному недоступному для дітей і тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів за температури від 0 °C до 25 °C.

Термін придатності

3 роки.

Лише для ветеринарної медицини!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»,

вул. Полтавський Шлях, 115, м. Харків, 61093, Україна.

+38(057) 766-36-36

Виробник готового продукту

ТОВ «НВП «СУЗІР'Я»

вул. Зернова, 4, м. Харків, 61105, Україна.

info@provet.ua

provet.ua